UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE NUTRIÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE

FERNANDA ELISABETE HILGENBERG

**PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO
CARDIOVASCULAR EM CADETES DA ACADEMIA DA
FORÇA AÉREA BRASILEIRA**

Goiânia
2013

FERNANDA ELISABETE HILGENBERG

**PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO
CARDIOVASCULAR EM CADETES DA ACADEMIA DA
FORÇA AÉREA BRASILEIRA**

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós Graduação em Nutrição e
Saúde, da Faculdade de Nutrição da
Universidade Federal de Goiás para obtenção
do Título de Mestre em Nutrição e Saúde

Orientadora: Profª Drª Cristiane Cominetti

Co-orientadora: Profª Drª Érika A. da Silveira

Linha de pesquisa: Diagnóstico e Intervenção
Nutricional e em Saúde

Goiânia
2013

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO E SAÚDE

BANCA EXAMINADORA DA DEFESA DE MESTRADO

Aluno(a): Fernanda Elisabete Hilgenberg

Orientador(a): Profa. Dra. Cristiane Cominetti

Co-Orientador(a): Profa. Dra. Érika Aparecida da Silveira

Membros:

1. Profa. Dra. Cristiane Cominetti (presidente)

2. Profa. Ana Luiza Lima Sousa (membro titular)

3. Profa. Dra. Estelamaris Tronco Monego (membro titular)

4. Profa. Dra. Maria do Rosário Gondim Peixoto (membro suplente)

5. Profa. Dra. Ana Tereza Vaz de Souza Freitas (membro suplente)

Data: 29/05/2013

Dedico este trabalho...

Ao meu querido irmão Luis Felipe Hilgenberg (in memoriam), o cadete mais amável que já conheci.

AGRADECIMENTOS

À minha querida orientadora, Profa. **Cristiane Cominetti** agradeço de coração toda sua dedicação e orientações nestes meses convivência e por ter acreditado no meu trabalho. Jamais esquecerei o que Sra. fez por mim!

Aos **cadetes voluntários da AFA** que aceitaram participar desta pesquisa, agradeço a disponibilidade apesar da rotina extensa de instruções e estudos.

Ao Sr. Coronel Aviador Mário Augusto **Baccarin**, Comandante do Corpo de Cadetes da Academia da Força Aérea (AFA) no ano de 2012, pela autorização e colaboração para realização deste estudo.

Ao Sr. Coronel Médico Joaquim Américo Ferreira **Bandeira**, Chefe da Subdivisão de Saúde no da AFA ano de 2012, por me permitir utilizar as instalações desta Unidade para coleta dos dados.

À Capitão Farmacêutica **Rosangela** Fim, chefe do Laboratório da Subdivisão de Saúde da AFA, agradeço por me auxiliar na coleta dos dados dos exames laboratoriais dos cadetes. Obrigada por toda sua dedicação e atenção em todos os momentos!

À Capitão Farmacêutica **Míriam** Borges de Souza Bittar, chefe do SAME, agradeço pela disponibilidade de marcação de consultas com os cadetes voluntários.

Ao Capitão Médico **Giogi** Ricardo Okino, chefe da Seção de Inspeção de Saúde, pela colaboração na coleta dos dados.

Ao Sargento Antonio **Miguel** Fonseca da SDS, por sua boa vontade e camaradagem ao longo da coleta de dados dos cadetes.

Ao Tenente Aviador Victor Thiago **Venâncio** da Penha, Instrutor de 4º Esquadrão, por me auxiliar na divulgação da pesquisa e recrutamento de voluntários.

Aos meus queridos **amigos de farda** que sempre estiveram ao meu lado: Cel Fernandes, Cap Wagner, Cap Alessandra, Ten Stauffer, Ten Renata Pimentel, Ten Leirner, Ten Luciana, Ten Camila, Ten Luciene, Sgt J. Oliveira e Sgt Vilella.

Às queridas amigas da **turma do Mestrado**, por terem me ajudado tanto com os trabalhos, seminários e afins. Obrigada pelos momentos de descontração e amizade.

À minha família amada: **Pai, Mãe, Júnior, Cris, João, Matheus** e todos aqueles compreenderam minha ausência nos últimos meses e que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos. Amo vocês!

Por fim, e não menos importante, agradeço ao meu marido, **Rodrigo**, por todo seu carinho, amor, paciência, incentivo e tudo mais que você me faz bem. Não sei o que seria de mim sem você.

RESUMO

As mudanças no estilo de vida contemporâneo refletem negativamente no estado de saúde dos indivíduos e estão associadas à incidência dos fatores de risco cardiovascular (FRCV) e, consequentemente, na gênese das doenças cardiovasculares (DCV). Atualmente, 31,3% das mortes no Brasil ocorrem em decorrências das DCV. Verifica-se que os FRCV vêm acometendo a população mais jovem, até mesmo os militares brasileiros. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de alguns FRCV em cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA). Tratou-se de um estudo observacional do tipo transversal que avaliou 166 cadetes do 1ª ao 4ª ano da AFA. A coleta dos dados foi realizada no Ambulatório de Nutrição da Subdivisão de Saúde da AFA, onde foram aferidos dados antropométricos: peso, estatura, índice de massa corporal, circunferência da cintura e dobras cutâneas. Houve coleta de sangue para avaliação do perfil lipídico e glicemia. A pressão arterial foi aferida em repouso. Registros alimentares de três dias foram coletados e analisados com o *software* Avanutri®. O estilo de vida foi avaliado por meio de questionário sobre atividade física e tabagismo. Os testes de Qui-Quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher foram empregados para avaliar a associação entre os FRCV, o gênero e o ano de formação dos cadetes na AFA. Os dados do consumo alimentar foram ajustados ao valor energético pelo método residual. O nível de significância de 5% foi adotado como padrão. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e aprovada sob Protocolo nº 189/12. Participaram da pesquisa 147 homens e 19 mulheres, com média ($\pm$ DP) de idade de 21,5 $\pm$ 1,2 e 21,6 $\pm$ 0,9 anos, respectivamente. Verificou-se que 29,7% dos cadetes homens e 16,7% das mulheres apresentaram sobrepeso ou obesidade. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) entre os homens foi de 15,2%. Quanto ao perfil lipídico, foi constatado que 50,7% dos cadetes apresentaram hipercolesterolemia, 24,3% apresentaram valores elevados de LDL-c e 11,2%, HDL-c baixa. Verificou-se associação significativa entre o tempo de permanência na AFA e HDL-c baixa. A prevalência de HDL-c baixa foi estatisticamente maior entre os cadetes dos 1º e 2º anos. Dados do consumo alimentar mostraram que 58,7% dos homens e 50% das mulheres apresentaram ingestão energética superior à necessidade diária. Houve consumo elevado de gorduras saturadas (87,2%) e colesterol (42,7%) entre os dois gêneros. Nenhum cadete atingiu as recomendações para ingestão de gorduras mono e poli-insaturadas. A ingestão inadequada de fibras alimentares foi verificada em 92,7% dos cadetes. Verificou-se que os jovens militares estão expostos a alguns FRCV de maneira semelhante aos jovens civis. Estes resultados são relevantes no sentido de criação e instalação de abordagens multiprofissionais voltadas para redução do risco das DCV ainda nas fases iniciais da vida adulta, assegurando, dessa forma, melhor qualidade de vida e diminuição de agravos à saúde cardiovascular em longo prazo dos futuros oficiais da Força Aérea Brasileira.

Palavras chave: fatores de risco; adulto; militares; doenças cardiovasculares.

ABSTRACT

Modifications in contemporary lifestyles reflect negatively on the individuals' health status and are associated with the incidence of cardiovascular risk factors (CVRF), and hence with the genesis of cardiovascular disease (CVD). Currently, 31.3% of deaths in Brazil occur in consequence of CVD. It is observed that CVRF have been affecting the younger population, even the Brazilian military. Therefore, the aim of this study was to determine the prevalence of some CVRF in cadets from the Brazilian Air Force Academy (AFA). It was a cross-sectional observational study that evaluated 166 cadets from the 1st to the 4th year of the AFA. Data collection was performed at the AFA's Clinic of Nutrition from the Health Subdivision, with measures of anthropometric data: weight, height, body mass index, waist circumference and skinfold thickness. Blood was collected for lipid profile and serum glucose evaluation. Blood pressure was measured at rest. Three-day food records were collected and analyzed using the software Avanutri[®]. Lifestyle was assessed with a questionnaire which included physical activity and smoking habit data. The Pearson Chi-Square or Fisher's exact tests were used to assess the associations between CVRF, gender and the year of entrance at the AFA. The food consumption data were adjusted to the energy by the residual method. The significance level of 5% was adopted as standard. The study was submitted to the Ethics Committee of Federal University of Goiás and approved under Protocol n°. 189/12. The sample was composed of 147 men and 19 women, mean ($\pm$ SD) age of 21.5 ± 1.2 and 21.6 ± 0.9 years, respectively. It was verified that 29.7% of men and 16.7% of women were overweight or obese. The prevalence of hypertension among men was 15.2%. The lipid profile revealed that 50.7% of the cadets had hypercholesterolemia, 24.3% had elevated LDL-c and 11.2%, low HDL-c. There was a significant association between the time spent at AFA and low HDL-c. The prevalence of low HDL-c was statistically higher among the cadets from the 1st and 2nd years. Food consumption data showed that 58.7% of men and 50% of women had an intake above the daily requirement. There was a high prevalence of saturated fats (87.2%) and cholesterol (42.7%) intake in both genders. No cadet reached the recommendations for monounsaturated and polyunsaturated fat intake and the inadequate intake of dietary fiber was reported in 92.7% of them. It was verified that the young military personnel are exposed to CVRF in a similar manner to young civilians. These results are relevant in order to create and install multidisciplinary approaches aiming at reducing the risk of CVD in the early stages of adulthood, thereby ensuring a better quality of life and reduction of cardiovascular health problems in the long term of the future officers of Brazilian Air Force.

Keywords: risk factors; adult; military personnel, cardiovascular diseases.

LISTA DE TABELAS

Capítulo 1

Tabela 1.	Pontos de corte para avaliação do consumo alimentar de cadetes da Academia da Força Aérea.....	31
Tabela 2.	Pontos de corte para Índice de Massa Corporal (<i>World Health Organization</i> , 2000).....	32
Tabela 3.	Pontos de corte para classificação do perfil lipídico sérico dos cadetes.....	35

Capítulo 2

Tabela 1.	Caracterização dos participantes da pesquisa, conforme gênero, Pirassununga-SP, 2013 (n=166).....	59
Tabela 2.	Prevalência de fatores de risco cardiovascular (FRCV) em cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira em toda amostra segundo gênero; análise de associação dos FRCV com gênero, Pirassununga-SP, 2013 (n=166).....	60
Tabela 3.	Prevalência e análise de associação de fatores de risco cardiovascular (FRCV) com ano de formação dos cadetes (n=166) na Academia da Força Aérea Brasileira, Pirassununga-SP, 2013...	61
Tabela 4.	Prevalência de consumo de risco para doenças cardiovasculares entre os cadetes da Academia da Força Aérea (n=110), Pirassununga-SP, 2013.....	62

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AFA	Academia da Força Aérea Brasileira
AMAN	Academia Militar das Agulhas Negras
CDA	Comissão de Desportos da Aeronáutica
COMAER	Comando da Aeronáutica
CT	Colesterol Total
Dc	Densidade Corporal
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DCV	Doenças Cardiovasculares
DIRSA	Diretoria de Saúde da Aeronáutica
FRCV	Fatores de Risco Cardiovascular
GC	Gordura Corporal
HAS	Hipertensão Arterial Sistêmica
HDL-c	Lipoproteína de alta densidade
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDL-c	Lipoproteína de densidade intermediária
IMC	Índice de Massa Corporal
LDL-c	Lipoproteína de baixa densidade
NCEP	<i>National Cholesterol Education Program</i>
NHANES	<i>National Health and Nutrition Examination Surveys</i>
PA	Pressão Arterial
PAD	Pressão Arterial Diastólica
PAS	Pressão Arterial Sistólica

POF	Pesquisa de Orçamentos Familiares
QM	Quilomícrons
RCQ	Razão Cintura Quadril
SDS AFA	Subdivisão de Saúde da Academia da Força Aérea
TG	Triacilglicerol
VET	Valor Energético Total
VIGITEL	Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
VLDL-c	Lipoproteína de muito baixa densidade
WHO/OMS	World Health Organization/Organização Mundial da Saúde

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1	11
1 INTRODUÇÃO	11
2 REVISÃO DA LITERATURA	13
2.1 Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares	13
2.2 Principais Fatores de Risco Modificáveis para Doenças Cardiovasculares	15
2.2.1 Hipertensão Arterial Sistêmica	15
2.2.2 Dislipidemias	17
2.2.3 Atividade Física/Sedentarismo	19
2.2.4 Consumo Alimentar	21
2.2.5 Tabagismo	23
2.2.6 Obesidade/Sobrepeso	26
3 OBJETIVOS	28
3.1 Objetivo geral	28
3.2 Objetivos específicos	28
4 MATERIAL E MÉTODOS	29
4.1 Delineamento	29
4.2 População	29
4.3 Critérios de inclusão	29
4.4 Cálculo Amostral	30
4.5 Avaliação do Consumo Alimentar	30
4.6 Avaliação Antropométrica	31
4.7 Determinação do perfil lipídico sérico	34
4.8 Determinação da glicemia de jejum	35
4.9 Aferição da pressão arterial	35
4.10 Análise do estilo de vida	36
4.11 Análise Estatística	37
4.12 Aspectos Éticos	38
5 REFERÊNCIAS	39
CAPÍTULO 2 – Artigo científico 1	49
CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
APÊNDICES	73
ANEXOS	86

CAPÍTULO 1

1 INTRODUÇÃO

As mudanças observadas nos padrões de estilo de vida da população contemporânea estão relacionadas aos processos de industrialização, urbanização e desenvolvimento econômico. Tais mudanças se refletem negativamente na saúde dos indivíduos, já que estão relacionadas a fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como hábitos alimentares inadequados, tabagismo, sedentarismo e ingestão nociva de álcool (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

No ano de 2008, aproximadamente 63% das causas de morte no mundo foram atribuídas às DCNT, representadas por enfermidades como obesidade, doenças cardiovasculares (DVC), diabetes melito, câncer e doenças respiratórias crônicas, (DA LUZ et al., 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

No Brasil e demais países da América Latina, verificou-se nas últimas décadas uma mudança marcante no perfil de mortalidade da população, caracterizada pelo aumento de óbitos em decorrência das DCNT em detrimento das causas infecciosas e parasitárias (RIBEIRO; COTTA; RIBEIRO, 2012). Atualmente no Brasil, 72% das causas de morte são atribuídas às DCNT (ANDRADE et al., 2013).

De acordo com o levantamento realizado pelo Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 2011-2022 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), observou-se uma redução de 20% na taxa de mortalidade ocasionada por DCNT na última década. Esse fenômeno relaciona-se à expansão da atenção primária, melhoria da assistência e diminuição do tabagismo nos últimos vinte anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Dentre as DCNT, as DCV e, conseqüentemente, os fatores de risco cardiovasculares (FRCV) representam as principais causas de mortalidade no mundo, totalizando 15,9 milhões de óbitos. No Brasil, verifica-se uma tendência declinante na mortalidade ocasionada por DCV, porém estas continuam sendo a principal causa de morte e hospitalizações no país, atingindo a marca de 31,3% de óbitos (ANDRADE et al., 2013; FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ et al., 2012).

Devido ao fato das DCV serem uma das principais causas de óbito no mundo e de sua ocorrência aumentar significativamente com o envelhecimento, é importante que se dissemine entre as populações civis e militares uma conscientização acerca de seus fatores de risco e a importância sobre sua prevenção e diagnóstico precoce (MCGRAW et al., 2008). Entretanto, apesar de sua natureza progressiva, os fatores de risco para DCV em estágios iniciais têm sido diagnosticados também em adultos jovens, fato constatado em estudo realizado em jovens americanos, onde mais de um terço da população de universitários já possui um ou mais fatores de risco para DCV (PASIAKOS et al., 2012).

Ainda com relação à faixa etária, estima-se que 40% das mortes ocasionadas por DCV situam-se na faixa inferior aos 65 anos, sendo que 26,8% dos óbitos atingem a população com idade entre 25 e 59 anos. Verifica-se, ainda, que no Brasil a mortalidade masculina é maior em todas as faixas etárias. Este dado pode ser parcialmente explicado devido a maior preocupação feminina com a saúde e a existência de programas e políticas de saúde voltadas para a saúde da mulher (CHAGAS et al., 2009).

Assim como acontece com a população civil, o aumento na prevalência de fatores de risco para DCV em jovens adultos também vem acometendo os militares das forças armadas, rotulados como uma população saudável, fisicamente ativa e com baixo risco de desenvolver DCNT (DUQUIA, 2010). Em estudo de revisão sobre os FRCV em militares americanos, foi observado que este grupo está menos fisicamente ativo, com peso e percentual de gordura mais elevados, quando comparados com militares recrutados antigamente (entre os anos de 1978 e 2003), o que indica a necessidade de estratégias para prevenção primária dos FRCV (PASIAKOS et al., 2012; KNAPIK et al., 2006).

Ressalta-se ainda que o rastreamento do risco cardiovascular em militares brasileiros é realizado no ato de admissão do militar e durante a inspeção de saúde anual. Estes resultados são utilizados para fins de reengajamento e acompanhamento do estado de saúde destes militares. Porém, verifica-se que existe pouca divulgação sobre o diagnóstico e à modificação dos FRCV por meio de mudanças no estilo de vida (DUQUIA, 2010).

Outro FRCV relevante relaciona-se ao consumo alimentar da população brasileira, pois apesar de haver inúmeras pesquisas que comprovem os benefícios para a saúde de uma alimentação equilibrada, a ingestão de grupos de alimentos

como frutas, hortaliças e leguminosas está abaixo do recomendado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (SILVA, 2011). Neste contexto, verifica-se a importância de se analisar o consumo alimentar de risco para DCV dos jovens militares.

Portanto, a justificativa do estudo está pautada no aumento da prevalência dos FRCV em adultos jovens e na falta de esclarecimento sobre as consequências negativas das DCV para as Forças Armadas Brasileiras, tendo em vista que a carreira militar exige de seu efetivo um estado de saúde adequado para o desempenho de missões específicas em tempos de paz ou de guerra, que podem levar o militar a extrapolar seus limites físicos.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares

Diversos estudos epidemiológicos têm demonstrado com clareza a relação entre os FRCV e o surgimento das doenças arteriais coronarianas. A pesquisa mais conhecida nessa área teve início em 1948, na cidade de Framingham, nos Estados Unidos, realizada a fim de identificar os fatores determinantes das doenças crônicas, responsáveis pelo elevado número de óbitos na população americana. Os resultados deste estudo foram relevantes para criação de uma ferramenta de monitoração das DCV, denominada Escore de Risco de Framingham (DAWBER et al., 1951; D'AGOSTINO; PENCINA, 2012; D'AGOSTINO et al., 2013).

A hipótese considerada na pesquisa foi a de que as DCV não apresentavam uma única causa, e sim um conjunto de fatores que atuavam lenta e progressivamente na instalação da condição clínica. Os principais fatores de risco apontados no estudo de Framingham foram a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o tabagismo, o colesterol sérico elevado e as alterações nas suas frações, o diabetes melito e a idade avançada (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 1998).

Outros órgãos que dedicam seus estudos às DCV, tais como o *National Cholesterol Education Program* (NCEP), a *American Heart Association*, a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, também tem proposto a inclusão de outros fatores de risco, além daqueles apontados pelo estudo de Framingham, com destaque para o papel da obesidade, dos padrões alimentares

e da inatividade física no risco cardiovascular (ROCHA, 2011). O *INTERHEART Study*, pesquisa multicêntrica internacional, com delineamento caso-controle e centros de pesquisa em 262 países, avaliou pacientes com infarto agudo do miocárdio pareados (quanto idade e gênero) com controles hospitalares e comunitários. Os autores consideraram nove fatores, responsáveis por 90% do risco para infarto agudo do miocárdio: tabagismo, dislipidemia, HAS, diabetes, obesidade, alimentação inadequada, atividade física insuficiente, consumo de álcool e fatores psicossociais (YUSUF et al., 2004).

Quanto à sua classificação, os fatores de risco para DCV são divididos em dois grupos: os não modificáveis, compreendidos por gênero, idade, etnia e herança genética; e os modificáveis ou comportamentais, que englobam a HAS, diabetes melito, sobrepeso, obesidade, inatividade física, tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas e consumo alimentar inadequado (FARIAS et al., 2009). Estes fatores comportamentais podem ser influenciados por aspectos condicionantes, como socioeconômicos, culturais e ambientais (BRASIL, 2008). Dentre os fatores não modificáveis, a idade é considerada a mais relevante para DCV, pois o risco de ocorrer acidente vascular cerebral dobra a cada década após os 55 anos. No que diz respeito ao gênero, a incidência de DCV é superior entre os homens; nas mulheres, o risco é maior após o período da menopausa (MACKAY, GEORGE, 2004).

Dados de estudos brasileiros de base populacional indicam prevalência elevada dos fatores de risco isoladamente, a exemplo do *Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal 2002-2003*, que mostrou alta prevalência de tabagismo (12,9% a 25,2%), inatividade física (28,2% a 54,5%), consumo de leite integral (61% a 87,2%) e consumo de gordura aparente da carne (48% a 49,3%) em diferentes faixas etárias e regiões do país (BRASIL, 2010; BRASIL, 2004).

Um estudo transversal de base populacional conduzido por Muniz e colaboradores (2012) avaliou a prevalência de fatores de risco modificáveis para DCV em adultos (n=2.732) no sul do Brasil e constatou que a inatividade física foi o fator mais prevalente (75,6%), seguido do consumo habitual de gordura aparente da carne (52,3%). Dois terços da população apresentaram dois ou mais fatores de risco comportamentais, valores considerados elevados pelos autores.

Questão importante relaciona-se ao início da instalação dos fatores de risco, havendo, frequentemente, a ideia de que estes fatores estejam presentes apenas em indivíduos em idade adulta ou mais avançada. Equivocadamente, muitas vezes acredita-se que indivíduos mais jovens possam estar protegidos em decorrência do fator idade (MOREIRA; GOMES; SANTOS, 2010; BARRETO; PASSOS; GIATTI, 2009). Neste contexto, Fonseca e col. (2010) avaliaram a pressão arterial (PA) e outras variáveis de risco cardiovascular em 115 indivíduos jovens (com idade entre 27 a 36 anos), acompanhados durante 17 anos no Rio de Janeiro. Os pesquisadores concluíram que a presença de sobrepeso e de obesidade desde a infância e a adolescência associou-se a maiores valores de pressão arterial (PA) e a maior prevalência de síndrome metabólica na fase adulta jovem.

Especificamente, no que se refere a jovens militares, pesquisas tem evidenciado que os FRCV são similares aos encontrados na população civil (ALDAHI ET AL., 2013; BARBOSA; SILVA, 2013; MACGRAW et al., 2008). Bray e col. (2009) constataram que aproximadamente 60% dos militares norte-americanos apresentaram IMC acima de 25 kg/m^2 , e a prevalência de dislipidemia e de tabagismo atingiu aproximadamente 30% desta população.

2.2 Principais Fatores de Risco Modificáveis para Doenças Cardiovasculares

2.2.1 Hipertensão Arterial Sistêmica

Dentre os fatores de risco modificáveis, a HAS é considerada a mais importante para o desenvolvimento das DCV. Trata-se de uma doença multifatorial, caracterizada por níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e fatores tróficos (que culminam na hipertrofia cardíaca e vascular) (PINTO et al., 2011).

A HAS atinge, em sua maioria, indivíduos na idade adulta, embora seja diagnosticada também na infância e adolescência. Nos últimos anos houve um aumento significativo da prevalência da doença em indivíduos jovens, ocasionado pelo estilo de vida inadequado (MOSER et al., 2011).

Após o diagnóstico, a HAS pode ser classificada em dois tipos: o primário, que corresponde a 95% dos casos, cuja etiologia está relacionada a diversos

fatores; e o secundário, que representa 5% dos casos, tendo como principais causas as doenças renais ou endócrinas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1985).

Entre os indivíduos jovens, o tipo mais comum é a HAS do tipo primária, de causa multifatorial, com destaque para associação entre valores elevados de PA e aumento de Índice de Massa Corporal (IMC) (TIROSH et al., 2010). A relação entre o excesso de peso e a HAS ocorre devido a distúrbios do metabolismo da insulina, alterações vasculares, ao aumento da agregação plaquetária e ao estresse oxidativo, com queda das concentrações de óxido nítrico, além de distúrbios do sono, fatores que auxiliam na elevação da PA (ROCHA, 2011).

No Brasil, a HAS é considerada um problema de saúde pública, com registros de prevalência atingindo cerca de 30% da população adulta brasileira (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). De acordo com o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), a prevalência de HAS referida foi de 24% em adultos acima de 18 anos, referente aos dados coletados no Brasil em 2009 (BRASIL, 2011).

Em pesquisa com adultos jovens da Universidade Federal de Viçosa (MG), o percentual de níveis pressóricos elevados atingiu a marca de 16,5% (RODRIGUES; DOIMO; MARINS, 2011). Em outra pesquisa semelhante, 244 universitários da área da saúde em São Caetano do Sul (SP), com média de idade de 22 anos, foram avaliados quanto ao estilo de vida e aos níveis pressóricos. Os resultados indicaram que 79,9% dos indivíduos apresentaram níveis pressóricos ótimos; 12,7%, níveis normais; 2,0%, níveis limítrofes e 5,3% tiveram diagnóstico de HAS leve (LEITE; SANTOS, 2011).

A prevalência de HAS e seus fatores associados foram investigados em estudo transversal que avaliou 380 jovens militares da Força Aérea Brasileira na cidade de São Paulo, com idade entre 19 e 35 anos. A HAS foi diagnosticada em 22% da população avaliada e a prevalência desta condição foi 68% maior entre ex-fumantes. Ainda, em indivíduos com sobrepeso e obesidade, as prevalências encontradas foram 75% e 78% superiores em comparação àqueles com peso eutrófico, respectivamente (WENZEL; SOUZA; SOUZA, 2009).

A PA elevada é o principal fator modificável de risco cardiovascular e está associada a outros fatores de risco como colesterol sérico elevado, percentual de gordura corporal e aptidão cardiorrespiratória. Outros fatores, incluindo sedentarismo e padrão alimentar aterogênico (caracterizado por ingestão elevada de gorduras

saturadas, gorduras trans, frituras, sódio e carboidratos simples) também estão associados ao aumento na PA de indivíduos adultos jovens (VASQUES; LOPES, 2009).

2.2.2 Dislipidemias

As dislipidemias são alterações metabólicas nas concentrações séricas de lipídios que causam modificações na homeostase do organismo, aumentando a formação de placas ateroscleróticas na túnica íntima dos vasos arteriais ou induzindo a formação de trombos que tem capacidade de ocluir as artérias, interrompendo o fluxo sanguíneo e ocasionado morte tecidual (CARDOSO et al., 2011).

Quanto à classificação, as dislipidemias são divididas em dois tipos: primárias ou secundárias. O tipo primário tem como fator determinante as alterações de ordem genética, sendo que algumas só se manifestam por influência ambiental, devido à alimentação inadequada e/ou ao sedentarismo. As secundárias são causadas por doenças como hipotireoidismo, diabetes melito, ou por uso indiscriminado de medicamentos como diuréticos, betabloqueadores, corticóides e esteróides. Vale ressaltar que o desequilíbrio entre a ingestão alimentar, a falta de atividade física, bem como o etilismo e o tabagismo em excesso, são fatores relacionados à etiologia das dislipidemias (CAMBRI et al., 2006).

Os lipídios são substâncias hidrofóbicas que necessitam ser transportadas no organismo por meio de proteínas, formando assim complexos hidrossolúveis de peso molecular elevado, denominados lipoproteínas (MARTINEZ, 2004).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), a classificação bioquímica das dislipidemias compreende quatro tipos principais:

- a) Hipercolesterolemia isolada: elevação isolada das concentrações de LDL-c, em geral representada por valores acima de 160 mg/dL;
- b) Hipertrigliceridemia isolada: elevação isolada dos TG acima de 150 mg/dL, caracterizada por aumento de volume de partículas ricas em TG, como VLDL-c, IDL-c e Qm;
- c) Hiperlipidemia mista: representada por valores aumentados de ambos LDL-c (acima de 160 mg/dL) e TG (acima de 150 mg/dL);

d) HDL-c baixa: com valores da HDL-c menores que 40 mg/dL em homens e menores que 50 mg/dL em mulheres, de forma isolada ou em associação com aumento de LDL-c ou de TG.

No Estudo de Framingham o colesterol sérico foi dosado em 1.959 homens e em 2.415 mulheres, com idades entre 31 e 65 anos, ambos sem diagnóstico de DCV ou câncer. Na população estudada até os 50 anos de idade foi verificado que a mortalidade em 30 anos estava diretamente relacionada com concentrações de colesterol total (CT), onde a mortalidade cardiovascular aumentou em 9% para cada 10 mg/dL de aumento de colesterol sanguíneo (ANDERSON; CASTELLI; LEVY, 2001).

No Brasil existem poucos estudos que determinaram a prevalência de dislipidemia de maneira abrangente. Muitas pesquisas nesta área envolvem grupos restritos, geralmente limitados à determinada faixa etária, pacientes atendidos em ambulatorios, ou com DCV diagnosticada, alunos ou funcionários de uma instituição, ou análise de banco de dados oriundos de laboratórios de análises clínicas, onde a maioria dos estudos avaliou apenas a concentração de CT, em detrimento da avaliação completa do perfil lipídico populacional (BRASIL, 2008).

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2007), as concentrações de CT em adultos com idade média de 35 anos $\pm$ 10 anos (n= 8.045) foram avaliadas em nove capitais brasileiras e os resultados evidenciaram que 38% dos homens e 42% das mulheres apresentavam CT maior que 200 mg/dL. Neste estudo, as maiores taxas de CT foram encontradas em mulheres nas faixas etárias mais elevadas.

Estudantes do curso de Medicina de São José do Rio Preto (SP) (n= 153), com idades entre 18 e 31 anos foram avaliados quanto ao perfil lipídico e sua correlação com DCV. Neste estudo foram detectadas concentrações alteradas de CT (11,8%), de LDL-c (9,8%) e de TG (8,5%), bem como concentrações reduzidas de HDL-c em 12,4% dos estudantes. Houve associação positiva entre perfil lipídico, IMC, sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica, uso de anticoncepcional, antecedentes familiares de acidente vascular cerebral e dislipidemia (COELHO et al., 2005).

Fisberg e colaboradores (2001) avaliaram o perfil lipídico e sua associação com fatores de risco para DCV de 118 estudantes universitárias em São Paulo (SP), com idade média de 20,3 anos. A prevalência de história familiar positiva para

doença isquêmica do coração foi de 38,9%; sedentarismo (35,6%); concentrações limítrofes de CT (17,7%) e LDL-c aumentado (10,2%); concentrações diminuídas de HDL-c (11,1%) e concentrações aumentadas de TG (11,1%); IMC acima de 25 (8,5%) e tabagismo (6,7%), ou seja, prevalência elevada de fatores de risco para DCV.

Estudo semelhante sobre a prevalência de dislipidemia também foi realizado com 12 jovens militares, de 20 a 22 anos de idade, que avaliou o padrão alimentar e sua relação com concentrações séricas de lipídios em cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na cidade de Resende-RJ. As médias ($\pm$ DP) das concentrações de TG ($100,2 \pm 30,5$ mg/dL) e de CT ($167,1 \pm 19,4$ mg/dL) foram consideradas ótimas de acordo com os valores de referência, porém as concentrações de HDL-c ($42,3 \pm 5,1$ mg/dL) e LDL-c ($105,3 \pm 18,3$ mg/dL) apresentaram-se apenas desejáveis. Dados do consumo alimentar mostraram uma associação positiva entre as concentrações de CT sanguíneo e o percentual calórico proveniente de lipídios totais e de gordura saturada (PRADO et al., 2004).

O estudo *Melany* (sigla para: metabolismo, estilo de vida e avaliação nutricional para adultos jovens) avaliou as variações das concentrações de TG e o risco de DCV em 13.953 militares jovens israelenses (com idades entre 25 e 35 anos). Os militares de carreira foram avaliados a cada 5 anos, até completarem 35 anos de idade. Os resultados mostraram que o aumento nas concentrações de TG entre o tempo inicial e final foi associado ao aumento no IMC e à diminuição da atividade física. No entanto, aqueles que tiveram uma diminuição no IMC e aumento de atividade física conseguiram diminuir as concentrações de TG. Entre aqueles militares que mantiveram as baixas concentrações de TG, houve associação com níveis estáveis de atividade física e IMC mais baixos (TIROSH et al., 2007).

2.2.3 Atividade física/Sedentarismo

A redução da prática de atividade física tem sido associada aos processos de urbanização, industrialização, progresso tecnológico, modificações e facilidades no ambiente de trabalho, em detrimento do tempo destinado ao lazer e prática de exercícios, principalmente nos indivíduos de menor nível socioeconômico. As atividades que anteriormente demandavam maior gasto energético, como as

domésticas, de lazer e as tarefas do dia-a-dia já não geram grande dispêndio de energia e favorecem o ganho de peso (PEIXOTO; BENÍCIO; JARDIM, 2007).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 250 mil vidas são perdidas anualmente devido à falta de exercício físico (OMS, 2004). Verifica-se ainda que de um total de 6,2 milhões de mortes ocorridas nas Américas no ano de 2005, mais de três quartos estavam associados às DCNT, o que credencia o sedentarismo como inimigo da saúde pública no mundo (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2007).

A prática de atividades físicas é medida fundamental na redução do risco de desenvolvimento da doença aterosclerótica, pois existem evidências de que esta é capaz de melhorar todos os parâmetros lipídicos, como HDL-c, LDL-c e TG, bem como melhorar a sensibilidade à insulina. Um estudo experimental com indivíduos dislipidêmicos indicou que o treinamento físico é capaz de aumentar as concentrações de HDL-c, em média, em 4,6% e diminuir 3,7% e 5% de LDL-c e TG, respectivamente (FERNANDES; SPONTON; ZANESCO, 2009).

Estudo com indivíduos fisicamente ativos em oito cidades do estado de São Paulo avaliou 2.720 adultos, onde a prevalência de dislipidemia foi de 12,2%, sendo que as mulheres e os indivíduos obesos apresentaram maiores taxas da doença. A prática de exercício físico, tanto na infância como na adolescência, foi associada com menor ocorrência de dislipidemias. (FERNANDES et al., 2011).

Da Luz e col. (2011) avaliaram o estado nutricional, os fatores de risco para DCV e a correlação com a prática de atividade física em 77 adultos, em São Paulo, com idade média de 31,5 anos. As variáveis CT sérico e prática de atividade física apresentaram correlação significativamente positiva, sendo que os indivíduos com taxas limítrofes de CT eram os que não praticavam atividades físicas regulares. Os valores mais elevados de TG séricos foram encontrados em indivíduos sedentários.

No âmbito das Forças Armadas Brasileiras, a prática de atividade física é condição essencial para a rotina desenvolvida pelos militares ao longo de suas carreiras, tanto que essa população é avaliada semestralmente pelo Teste de Aptidão Física (MUNIZ, 2010). Além disso, os militares são treinados para estar sempre prontos para operações nas condições mais adversas.

O conhecimento do estado de saúde e do condicionamento físico dos militares é prioridade nas Forças Armadas. No Comando da Aeronáutica (COMAER), a Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA) e a Comissão de

Desportos da Aeronáutica (CDA) são responsáveis por estas avaliações físicas, além de auxiliar na capacitação de seu efetivo para exercício da profissão. (MUNIZ, 2010).

Em estudo sobre a relação do risco cardiovascular e os efeitos do treinamento básico de combate em 209 recrutas americanos (idade média de 23 anos), verificou-se que o volume de treinamento físico, aliado ao elevado gasto energético causou diminuição nas concentrações de CT, de LDL-c e de TG dos militares, em três semanas de treinamento. Como conclusão, o estudo indicou que mudanças no risco cardiovascular em adultos jovens podem ser alcançadas em curto período de tempo por meio de alimentação saudável e atividade física regular (PASIAKOS et al, 2012).

Jovens militares da Finlândia com idade média de 19,3 anos foram avaliados quanto aos efeitos do treinamento físico sobre os fatores de risco para DCV. Ao final de doze meses de treinamento houve redução de peso, IMC, circunferência da cintura, percentual de gordura, gordura visceral, PA sistólica, CT, TG e LDL-c. A melhora significativa nos fatores de risco para DCV foi atribuída à perda de peso e à redução da gordura visceral (CEDERBERG et al., 2011).

Há evidências de que a aterosclerose se inicia na infância e progride na idade adulta, assim como a gravidade do processo é determinada diretamente pelos fatores de risco incorporados pelo indivíduo ao longo dos anos. Por esta razão acredita-se que a prevenção dos FRCV e DCV deva ser iniciada na infância, pautada pela educação e promoção da saúde cardiovascular, com ênfase na alimentação adequada e na manutenção da prática de atividade física regular para toda vida (BEVILAQUA et al., 2011).

2.2.4 Consumo alimentar

As mudanças observadas nos padrões alimentares nas últimas décadas atingem não somente os países desenvolvidos, como também os que estão em desenvolvimento e são caracterizadas por aumento na ingestão de alimentos gordurosos e ricos em açúcares, diminuição no consumo de frutas, legumes e verduras, leite e derivados, fato que implica no aumento da prevalência de fatores de risco para DCV, como obesidade, PA elevada e dislipidemias (OLINTO et al., 2012).

Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 referentes ao consumo de grupos de alimentos indicaram que o grupo dos tubérculos, cereais, leguminosas e raízes corresponde a 45% das calorias totais; o grupo dos alimentos essencialmente calóricos (óleos e gorduras vegetais, gordura animal, açúcares, refrigerantes e bebidas alcoólicas) soma 28% das calorias; alimentos de origem animal (carnes, leite e derivados e ovos) atingem 19%; enquanto que frutas, legumes e verduras representam apenas 2,8% das calorias (IBGE, 2011).

Verifica-se que menos de 10% da população atinge as recomendações de ingestão de verduras, legumes e frutas, conforme orientações preconizadas pela *World Health Organization* (2004) e pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2005), que são de pelo menos 400 gramas diários destes alimentos ou cerca de 9 a 12% das calorias totais para um plano alimentar de 2000 kcal. O consumo de leite e derivados encontra-se também muito aquém do recomendado (IBGE, 2011).

Uma questão bastante relevante sobre os hábitos alimentares dos adultos brasileiros, com idades entre 19 e 59 anos, refere-se à prevalência excessiva de consumo de gordura saturada (superior a 7% do valor energético total – VET), atingindo 82% dos homens e 87% nas mulheres. O consumo de fibras abaixo da recomendação ($\leq 12,5$ g por 1000 kcal) foi verificado em 71% dos homens e 75% das mulheres avaliadas na última POF. No que se refere ao consumo excessivo de açúcar livre (acima de 10% do total de energia), a inadequação foi constatada em 67% dos homens e mulheres (IBGE, 2011).

A população de militares também está incluída no processo de mudanças nos hábitos alimentares, mesmo sendo rotulada por cultivar hábitos e estilo de vida saudáveis. Donadussi e colaboradores (2009) avaliaram a relação entre a ingestão de lipídios e os indicadores de adiposidade abdominal em 183 policiais militares em Cascavel – PR (idades entre 21 e 50 anos) e concluíram que a ingestão de lipídios se mostrou alterada em 70,7% dos avaliados, dos quais 32% ingeriram lipídios saturados acima da recomendação. Houve associação positiva entre o consumo de lipídios totais e presença de adiposidade abdominal.

O consumo de lipídios e a relação com concentrações séricas de lipoproteínas foram avaliados em cadetes (n=12) da AMAN. Os dados obtidos indicaram que houve associação positiva entre as concentrações séricas de CT e o

percentual calórico proveniente de lipídios totais e de lipídios saturados oriundos da alimentação (PRADO et al., 2004).

Os resultados das pesquisas atuais sobre o consumo alimentar comprovam, em sua maioria, a influência dos hábitos alimentares inadequados sobre a incidência das DCNT (OLINTO et al., 2012), tanto na população civil como entre os militares. Portanto, ressalta-se a importância da investigação e avaliação do consumo alimentar nestas populações a fim de identificar os pontos críticos e subsidiar ações que estimulem a prevenção das DCNT, em especial as DCV.

2.2.5 Tabagismo

O tabagismo é considerado uma das grandes ameaças à saúde pública atualmente, pois já existe a comprovação de que o hábito de fumar está relacionado a 71% das mortes ocasionadas por câncer de pulmão, 42% das causas das doenças crônicas respiratórias e aproximadamente 10% das DCV (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011).

De acordo com levantamento realizado pela *Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab 2008) – Relatório Brasil*, existia no Brasil, no ano de 2008, 24,6 milhões de fumantes, que representavam 17,2% da população adulta, com maior prevalência entre os homens (21,6%) e atingindo 13,1% das mulheres. A prevalência de tabagismo mostrou-se superior nas pessoas com idade de 45 a 64 anos (22,7%), nos moradores da região Sul (19%), entre os moradores das áreas rurais (20,4%), entre os indivíduos de menor escolaridade (25,7%) e entre os de menor de renda (23,1%) (IBGE, 2009; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).

Há que se ressaltar uma diminuição na prevalência do tabagismo entre os adultos acima de 18 anos no Brasil nas últimas décadas. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), a prevalência de fumantes era de 34,8% em 1989 (INAN, 1990) e passou para 22,4% em 2004, conforme apontado pela Pesquisa Mundial de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004).

Verifica-se atualmente uma tendência mundial referente ao aumento da prevalência de tabagismo entre os adultos jovens, principalmente naqueles jovens universitários. Em pesquisa sobre a prevalência de tabagismo em 368 jovens universitários na cidade Lins – SP verificou-se que 11,7% eram tabagistas, sendo

6,3% de fumantes regulares e 5,4% de fumantes ocasionais. Neste estudo, mais de 80% dos fumantes avaliados iniciaram o hábito antes dos 19 anos de idade (ALMEIDA et al., 2011). Outro estudo semelhante avaliou estudantes universitários (n=485) de Pelotas-RS, com idade média de 22,6 anos, onde a prevalência de tabagismo atingiu 11,4% dos homens e 8,8% das mulheres, ambos relataram que fumam regularmente ou aos fins de semana (RAMIS et al., 2012).

No âmbito das Forças Armadas norte-americanas o hábito de fumar é motivo de preocupação pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tendo em vista o histórico de prevalência elevada de tabagismo de 41,2% entre os militares em comparação à população civil. Os efeitos adversos provocados pelo fumo afetam a condição de trabalho de militares, ocasionando diminuição no desempenho e aptidão física (WOODRUFF et al., 2010; OLMSTED et al., 2011).

Talcott e col. (2013) avaliaram a prevalência de fumo e o consumo de tabaco entre 278 militares da Força Aérea Americana e identificaram que mais da metade dos avaliados (de 53 a 63%) utilizaram tabaco em todos os estágios do treinamento militar. Outra particularidade observada neste estudo foi de que a prevalência de tabagismo aumentou de 31% para 40% nos períodos em que os militares estiveram em missões reais de guerra.

A prevalência de tabagismo entre os militares brasileiros tem sido apontada em estudos pontuais abrangendo populações de diferentes especialidades. Barbosa e Silva (2013) avaliaram os FRCV em 112 policiais militares com idades de 20 a 54 em Cachoeira do Sul e identificaram que apenas 8,9% eram tabagistas. Militares da Marinha Brasileira (n=1.383) com idades entre 18 a 62 anos apresentaram prevalência de tabagismo de 9,7% (COSTA et al., 2011). Em pesquisa envolvendo 380 militares homens da Força Aérea Brasileira, com idades entre 19 e 35 anos, a prevalência de tabagismo encontrada foi de 12,9% (WENZEL; SOUZA; SOUZA, 2009).

Apesar de serem constatadas reduções da prevalência de tabagismo no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) é importante que se investigue a prevalência deste FRCV entre os cadetes da AFA, devido aos efeitos nocivos do tabagismo. Os malefícios devem-se à grande quantidade de elementos tóxicos e carcinogênicos presentes no cigarro e outros tipos de fumo. Dentre esses elementos, destaca-se a ação da nicotina, um composto bioativo atuante no sistema nervoso simpático, que

afeta o sistema cardiovascular ocasionando um aumento na PAS e PAD, da frequência e débito cardíacos, além de ocasionar provocar lesões nas células endoteliais (FILION; LUEPKER, 2013).

2.2.6 Obesidade/Sobrepeso

A obesidade é uma DCNT caracterizada pelo excesso de gordura corporal, sendo considerada um grave problema de saúde pública atualmente, atingindo proporções epidêmicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo classificada como fator de risco independente para DCV (PINHO et al., 2013). Os fatores ambientais contribuem sobremaneira para o balanço energético positivo, com destaque para diminuição da prática de atividade física e aumento de ingestão de alimentos de elevado teor energético. Há que se ressaltar ainda o papel da herança genética na etiologia da obesidade (SELASSIE, SINHA, 2011).

A prevalência da obesidade tem aumentado significativamente no Brasil nas últimas duas décadas. Os resultados da POF referentes aos adultos com idades acima de 20 anos mostraram que 50,1% dos homens e 48% das mulheres apresentavam sobrepeso, enquanto que 12,5% e 16,9% foram diagnosticados como obesos, respectivamente (IBGE, 2011). Estima-se que nos Estados Unidos e na Europa ocidental a prevalência de obesidade alcance em média 50% da população adulta (LHACHIMI et al., 2013).

De maneira semelhante ao que ocorre com os outros FRCV, a prevalência de sobrepeso e obesidade tem sido diagnosticada em adultos jovens civis e militares. O desenvolvimento precoce de excesso de peso na infância e adolescência é o principal responsável pela instalação da obesidade na idade adulta. Existem evidências de que o período de maior risco para instalação de obesidade seja durante a transição da adolescência para o início da vida adulta, para ambos os gêneros, de acordo com os resultados da pesquisa de Gordon-Larsen e colaboradores (2004).

As mudanças na composição corporal em adultos jovens, caracterizadas pelo excesso de peso, têm ocasionado problemas no sistema de recrutamento dos jovens civis para as Forças Armadas, pois os critérios de seleção para a vida militar exigem que seus candidatos tenham peso adequado e resistência cardiorrespiratória

para suportar as demandas do treinamento básico, que podem ser afetadas pelo excesso de gordura corporal (YAMANE, 2007).

Nos Estados Unidos existe uma grande preocupação quanto à incorporação dos jovens civis nas Academias Militares de formação dos futuros oficiais americanos devido aos rígidos critérios de seleção na avaliação da condição física. Neste sentido, Cawley e Maclean (2012) estimaram a porcentagem dos candidatos elegíveis às vagas das Academias Militares nos EUA que excederam os padrões de peso para estatura no momento da admissão por meio da avaliação dos dados do *National Health and Nutrition Examination Surveys* (NHANES), entre os anos de 1959-2010. Os resultados mostraram que os pontos de corte para avaliação do peso e percentual de gordura corporal no ato da admissão aumentaram mais que o dobro para os homens e quadruplicaram entre as mulheres ao longo destes anos de investigação.

Além das complicações causadas à saúde e ao bem estar dos indivíduos, a obesidade pode afetar a produtividade no trabalho e aumentar os custos referentes ao tratamento médico da doença (CAWLEY, MACLEAN, 2011). Pesquisas com militares apontam que indivíduos portadores de sobrepeso ou obesidade apresentam mais chances de abandonar o treinamento militar quando comparados a militares com peso adequado, especialmente entre as mulheres (KNAPIK et al., 2001; PACKNETT et al., 2011). Estima-se que entre os militares do serviço ativo americano, o excesso de peso e a obesidade sejam responsáveis por 658.000 dias de trabalho perdidos, o que gera um déficit de produtividade na faixa de 105,6 milhões de dólares (CAWLEY, MACLEAN, 2011).

Desta forma, conclui-se que o impacto causado pelo excesso de peso na população adulta jovem pode afetar a qualidade de vida destes indivíduos, tanto no aspecto de saúde quanto no quesito financeiro.

As evidências científicas a respeito da abrangência e das consequências negativas ocasionadas pelas DCV no Brasil e no mundo indicam um aumento na exposição dos FRCV entre os adultos jovens, motivado por alterações comportamentais. A mensuração dos comportamentos de risco cardiovascular entre os jovens pode subsidiar dados que auxiliem na diminuição ou progressão das DCV nos ciclos iniciais da vida. Neste contexto, ressalta-se a importância da investigação da prevalência dos FRCV entre os cadetes brasileiros, pouco relatado no país, com

intuito de fornecer informações mais aprofundadas acerca do estilo de vida desta população e propor ações de prevenção primária.

3 OBJETIVOS:

3.1 Objetivo Geral

Estimar a prevalência dos fatores de risco cardiovascular em cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira.

3.2 Objetivos Específicos

- Descrever o perfil da amostra estudada, estratificada por gênero, quanto a variáveis antropométricas, bioquímicas, clínicas, de estilo de vida e de consumo alimentar;
- Determinar a prevalência dos seguintes fatores: sobrepeso, obesidade total e abdominal, adiposidade, tabagismo, nível de atividade física, pressão arterial elevada, glicemia de jejum alterada, dislipidemias, conforme gênero e ano de formação na Academia;
- Caracterizar o consumo alimentar de risco para DCV: ingestão energética superior às necessidades estimadas, consumo de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios), bem como de colesterol, gorduras saturadas acima dos valores de referência; ingestão de gorduras mono e poli-insaturadas e ingestão de fibras alimentares inferior ao recomendado.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Delineamento

Tratou-se de um estudo observacional do tipo transversal.

4.2 População

A população do estudo foi composta por cadetes matriculados no curso de Formação de Oficiais da Academia da Força Aérea (AFA), localizada em Pirassununga-SP. Durante o curso de formação os cadetes aviadores, infantes e intendentes cumprem, durante quatro anos, o programa de treinamento militar que objetiva a formação acadêmica e técnico-especializada, de liderança e militar, que inclui assuntos relacionados ao treinamento e ao condicionamento físico dos cadetes (LOPES, 2010).

Os cadetes foram convidados a participar da pesquisa por meio de palestras explicativas sobre a relevância do estudo e divulgação em cartazes espalhados pela Academia.

4.3 Critérios de Inclusão

Os indivíduos incluídos na pesquisa foram submetidos aos seguintes critérios: estarem matriculados na Academia da Força Aérea Brasileira (do 1º ao 4º ano), apresentar idade entre 20 a 30 anos, não utilizar fármacos com potencial de interferir no perfil bioquímico de lipídios séricos, não apresentar estados espoliativos, como infecção, inflamação, febre, estresse metabólico e diarreia e não estar em período gestacional (para o gênero feminino).

A coleta dos dados antropométricos foi realizada pela pesquisadora. Os exames bioquímicos foram realizados no Laboratório de Subdivisão de Saúde da AFA.

4.4 Cálculo Amostral

Considerando a relativa ausência de dados de prevalência de FRCV em jovens militares, o cálculo do erro máximo foi realizado *a posteriori* com base no desfecho prevalência de hipercolesterolemia, em uma população finita de 800 cadetes (N), uma amostra de 166 cadetes (n) e um nível de confiança de 95%, por meio da fórmula:

$$n = \frac{o^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2 \cdot (N - 1) + o^2 \cdot p \cdot q}$$

Onde:

o^2 é o nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão

p é a porcentagem com a qual o fenômeno foi verificado

q é a porcentagem complementar (100 – p)

e é o erro máximo verificado

N é o tamanho da população (MAROTTI et al., 2008)

4.5 Avaliação do Consumo Alimentar

A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio de registro alimentar de três dias não consecutivos (dias escolhidos pelos próprios cadetes), incluindo um dia de final de semana, de acordo com Basiotis et al. (1987). Para isto todos os indivíduos receberam um formulário padronizado com instruções detalhadas sobre o preenchimento dos registros (Apêndice 2), além de orientações específicas durante a entrevista inicial para seleção da amostra, proferidas por uma única nutricionista (pesquisadora). Depois que os cadetes procederam ao preenchimento dos registros, todos os formulários foram conferidos por nutricionista habilitado. Estes registros foram avaliados com auxílio do *software* Avanutri® (Rio de Janeiro, Brasil). Para cálculo da ingestão alimentar e determinação do valor energético total (VET), os dados foram inseridos no programa em forma medidas caseiras e utilizou-se a média de consumo alimentar para os três dias fornecida pelo *software*.

A avaliação da adequação do consumo dos macronutrientes e ingestão de fibras foi realizado com base nos pontos de corte propostos pela *World Health Organization* (2003). A adequação do perfil de ácidos graxos foi baseada nas últimas

recomendações propostas pela I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular, emitida no ano de 2013 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013), conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Pontos de corte para avaliação do consumo alimentar de cadetes da Academia da Força Aérea.

Nutrientes	Ingestão recomendada
Gordura total	15 a 30% das calorias totais
Ácidos graxos saturados*	≤ 7% das calorias totais
Ácidos graxos poli-insaturados*	6 a 10% das calorias totais
Ácidos graxos monoinsaturados*	≤ 20% das calorias totais
Colesterol	<300mg/dia
Carboidratos	55 a 75% das calorias totais
Proteínas	10 a 15% das calorias totais
Fibras	> de 25 gramas/dia
Calorias#	Ajustado ao peso desejável

Fonte: *World Health Organization* (2003); Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013)*; *Institute of Medicine* (2005)#.

Além da determinação do VET médio dos cadetes, foi realizado o cálculo das necessidades energéticas, com base na Necessidade Energética Estimada (*Estimated Energy Requirement* - EER), de acordo com as recomendações propostas pelo *Institute of Medicine* (2005).

4.6 Avaliação Antropométrica

A avaliação antropométrica foi realizada pela pesquisadora (nutricionista) no ambulatório de Nutrição do Serviço de Saúde da AFA. As medidas foram anotadas no questionário sobre estilo de vida (Apêndice 1).

Os dados referentes ao peso e estatura foram utilizados para cálculo do IMC, dividindo-se o peso em quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado [IMC = peso (kg) / estatura (m)²]. Os pontos de corte para classificação do IMC foram baseadas nas referências propostas pela *World Health Organization* (2000), conforme descrito abaixo:

Tabela 2: Pontos de corte para Índice de Massa Corporal (*World Health Organization*, 2000).

IMC (Kg/m ²)	Classificações
< 18,5	Baixo peso
18,5 – 24,9	Peso normal
25,0 – 29,9	Sobrepeso
30,0 - 34,9	Obesidade grau I
35,0 – 39,9	Obesidade grau II
>40,0	Obesidade grau III

Fonte: *World Health Organization*, 2000.

O peso foi obtido com o uso de balança digital da marca Filizola[®] (São Paulo, Brasil) com capacidade para 300 kg e precisão de 100 gramas, onde cada cadete foi posicionado no centro da plataforma, sem calçados e trajando roupas leves.

A estatura foi avaliada por meio de estadiômetro fixado na parede, com graduação em centímetros e esquadro móvel para posicionamento sobre a cabeça do cadete, que no momento da aferição permaneceu em posição ereta, com os pés unidos e olhando para frente (LOHMAN, ROCHE, MARTORELL, 1988).

A avaliação da obesidade abdominal foi determinada a partir da circunferência da cintura, cuja medida foi aferida com fita métrica inelástica, dividida em centímetros. A medida foi realizada no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela no momento da expiração (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). A avaliação dos pontos de corte para circunferência da cintura foram baseados naqueles propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), a saber:

- Homens: < 94 centímetros;
- Mulheres: < 80 centímetros.

As medidas de circunferência de cintura foram utilizadas para diagnosticar a obesidade abdominal, auxiliar no diagnóstico da obesidade em cadetes, bem como avaliar o grau de risco para DCV. Os valores acima de 80 centímetros para homens e 94 para as mulheres indicam risco aumentado para DCV (LEAN;HAN; MORRISON, 1995).

As medidas das dobras cutâneas foram aferidas para avaliação da adiposidade total em cadetes. A tomada das dobras foi realizada em triplicata com a utilização do adipômetro da marca Sanny[®], (São Paulo, Brasil) segundo metodologia

proposta por Guedes e Guedes (2003) e Harrison et al (1988), conforme descrito abaixo:

- Dobra cutânea tricipital: a medida foi realizada na face posterior do braço, paralelamente ao eixo longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre a borda súpero-lateral do acrômio e o olecrano;
- Dobra cutânea subescapular: a medida foi executada obliquamente em relação ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizada a dois centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula;
- Dobra cutânea suprailíaca: obtida obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar medial. Para permitir a execução da medida, foi necessário que o avaliado afastasse o braço para trás;
- Dobra cutânea abdominal: medida aproximadamente a dois centímetros à direita da cicatriz umbilical, paralelamente ao eixo longitudinal, no plano vertical;
- Dobra cutânea da coxa: medida paralelamente ao eixo longitudinal, sobre o músculo reto femoral a um terço de distância do ligamento inguinal e a borda superior da patela. Para facilitar o pinçamento desta dobra, o avaliado foi orientado a deslocar o membro inferior à frente, com uma semi-flexão do joelho, e a manter o peso do corpo no membro inferior esquerdo.

As fórmulas utilizadas para cálculo da densidade corporal (Dc) e do percentual de gordura (% GC) foram baseadas na metodologia descrita por Siri (1961) e Guedes e Guedes (1991), respectivamente, conforme descrição abaixo:

Gênero masculino

$$Dc = 1,17136 - 0,06706 * \text{LOG} (DC \text{ AB} + DC \text{ SE} + DC + TR)$$

DC= dobra cutânea

AB = abdômen

SE = subescapular

TR = tríceps

$$\% \text{ GC} = (4,95/Dc - 4,5) * 100$$

Gênero feminino

$$Dc = 1,1665 - 0,0706 * LOG (SE + SI + CX)$$

SI = supra-iliaca

CX = coxa

$$\% GC = (5,01/Dc-4,57) * 100$$

Os pontos de corte adotados para avaliação da gordura corporal foram aqueles propostos por Lohman, Roche, Martorell (1991), a saber:

- Homens (Ideal): < 15% de GC; e Mulheres (ideal): < 23% de GC.

As medidas de gordura corporal foram utilizadas com intuito de auxiliar o diagnóstico de sobrepeso e obesidade nos cadetes, pois não são consideradas FRCV. O diagnóstico de excesso de peso por meio de IMC pode fornecer uma estimativa imprecisa quanto à composição de massa de gordura e massa magra, ocasionando resultados falso-positivos (NUNES et al., 2009).

4.7 Determinação do perfil lipídico sérico

Para a realização dos exames laboratoriais, os participantes do estudo foram orientados a comparecer ao Laboratório da Subdivisão de Saúde (SDS) da AFA, em jejum de 12 horas, para coleta de sangue. A coleta foi realizada por profissional habilitado, com utilização de seringas descartáveis e agulhas de aço inoxidável, também descartáveis. As amostras de sangue (15 mL) foram transferidas para tubos de polipropileno adequados a realização dos exames de perfil lipídico. O processamento das amostras de sangue necessárias e a determinação dos exames bioquímicos foram conduzidos pelo Laboratório da SDS da AFA. As amostras de sangue não utilizadas foram apropriadamente descartadas.

A verificação do perfil de lipídios séricos dos cadetes foi realizada por meio de métodos colorimétricos enzimáticos (BERGMEYER, 1974), com utilização de kits das marcas Biotécnica® (Minas Gerais, Brasil) e Biosystems® (Paraná, Brasil). As leituras dos exames foram realizadas com utilização do analisador bioquímico Labmax Plenno, marca Labtest® (Minas Gerais, Brasil). O colesterol contido na fração HDL-c foi determinado após precipitação da LDL-c e da VLDL-c. As frações

LDL-c e VLDL-c foram calculadas a partir da equação de Friedewald (1972), onde $LDL-c = CT - (VLDL-c + HDL-c)$; $VLDL-c = TG / 5$.

Os pontos de corte para interpretação dos resultados foram baseados nos parâmetros propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010), conforme Tabela 3. Entretanto, cabe destacar que as IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose (2010) não especifica um ponto de corte para colesterol total, portanto optou-se neste estudo por utilizar a referência proposta pelo *National Cholesterol Education Program/Adult Treatment Panel III* (2002), que indica diminuição de prevalência de DCV associada a valores de CT abaixo de 150 mg/dL. Aliado a este fato, considerou-se também a questão da população avaliada ser jovem e fisicamente ativa.

Tabela 3: Pontos de corte para classificação do perfil lipídico sérico dos cadetes.

Perfil lipídico	Valores de referência
Hipertrigliceridemia	> 150 mg/dL
Hipercolesterolemia	> 150 mg/dL
HDL-c baixo	< 40 mg/dL
LDL-c elevado	> 100 mg/dL

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010; NCEP/ATPIII (2002)

4.8 Determinação da Glicemia de Jejum

A glicemia de jejum foi avaliada de acordo com a metodologia enzimática colorimétrica automatizada, com utilização de Kit da marca Biotécnica[®] (Minas Gerais, Brasil) e aparelho analisador bioquímico Labmax Plenno, marca Labtest[®]. O valor determinado como ponto de corte foi de 100 mg/dL, considerado como limítrofe para diagnóstico de diabetes melito (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).

4.9 Aferição da Pressão Arterial (PA)

A aferição de PA foi realizada pela enfermeira da Subdivisão de Saúde durante a inspeção de saúde dos cadetes. Os valores de PA foram obtidos por meio da utilização de esfigmomanômetro analógico, marca Becton Dickinson do Brasil[®]

(São Paulo, Brasil), calibrado pelo INMETRO, com manguito de tamanho adequado para circunferência de braço dos avaliados, sendo realizadas duas medidas para cada participante, com os cadetes permanecendo em repouso de 5 minutos antes da aferição. Para o procedimento de coleta dos dados, os cadetes permaneceram sentados, com braço nu para colocação do manguito, que foi posicionado na altura do coração e cobrindo 2/3 do braço, sendo inflado rapidamente e desinflado lentamente, em conformidade com as recomendações propostas pela VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). Para análise estatística considerou-se a segunda medida.

Neste estudo, optou-se por utilizar os valores limítrofes de PA para diagnóstico de HAS, cujos valores foram: maior ou igual a 130 mmHg para pressão arterial sistólica (PAS) e maior ou igual a 85 mmHg para pressão arterial diastólica (PAD), pois a população avaliada foi composta por jovens adultos e fisicamente ativos, fatores que não são considerados de risco para DCV (Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de Hipertensão/Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2010).

4.10 Análise do estilo de vida

Os cadetes foram avaliados por meio de entrevista individual, composta por questões relativas ao estilo de vida, a história familiar para DCV, a prática de atividade física e ao tabagismo, conforme questionário descrito no Apêndice 1.

A prática de atividade física foi avaliada por meio de registro dos relatos das atividades realizadas pelos cadetes durante as aulas de Educação Física, considerada disciplina obrigatória no âmbito da AFA. As atividades foram contabilizadas em minutos/semana. De acordo com as orientações propostas por *World Health Organization* (2010), verifica-se que a recomendação é de que a prática de atividade física seja maior ou igual a 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana. O somatório abaixo de 150 minutos de atividades moderadas foi o ponto de corte utilizado para classificar os cadetes como insuficientemente ativos ou sedentários. Para quantificação da atividade física como moderada ou intensa utilizou-se a escala de Equivalentes Metabólicos (MET), onde os valores de MET de 3,0 a 5,9 são considerados como

atividades moderadas e o MET acima de 6 representa atividade intensa (U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES- HHS, 2008).

4.11 Análise Estatística

A análise estatística foi realizada com o auxílio dos softwares STATA/SE versão 8.0. e *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versão 13.0. Realizou-se análise descritiva dos dados e estes foram apresentados como média $\pm$ desvio padrão para variáveis contínuas ou em porcentagem para variáveis categóricas. Para comparação de médias, inicialmente, a distribuição dos dados foi testada quanto à normalidade por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Quando os dados apresentaram distribuição normal, utilizou-se o teste t de Student para amostras não pareadas. Os testes de Qui-Quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher foram empregados para avaliar a associação entre os FRCV, o gênero e o ano de formação dos cadetes na AFA. O nível de significância de 5% foi adotado como padrão.

Para análise de associação entre os FRCV e o ano de formação dos cadetes optou-se por separar os cadetes em duas turmas principais, uma composta por cadetes do 1º e 2º anos (cadetes mais jovens) e outra composta por cadetes do 3º e 4º anos (cadetes mais velhos).

Com o objetivo de avaliar os dados do consumo alimentar independentes da ingestão de energia, os valores de ingestão dos macronutrientes, gorduras saturadas, poli-insaturadas e monoinsaturadas, colesterol e fibra alimentar foram ajustados ao valor energético. Este procedimento foi realizado de acordo com o método residual (JAIME et al., 2003). Para isto, os valores de ingestão destes nutrientes foram testados quanto a sua distribuição normal por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi determinada a correlação linear de Pearson para verificar se havia correlação estatisticamente significativa entre os valores de ingestão de cada nutriente e de energia. Em seguida realizaram-se testes de regressão linear simples, com a energia sendo considerada a variável independente e cada nutriente, as variáveis dependentes. Com os valores de β_0 e β_1 determinaram-se os valores dos nutrientes estimados, residuais, constantes e ajustados. Ao final, a média dos valores de ingestão destes nutrientes em suas formas ajustadas foi igual à média

dos valores em suas formas brutas, e os desvios-padrão dos nutrientes ajustados foram reduzidos.

4.12 Aspectos Éticos

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e aprovado conforme especificado em Parecer Consubstanciado (Protocolo nº 189/12) (Anexo 1), deste modo, foi possível assegurar o respeito aos princípios éticos em pesquisas envolvendo seres humanos, conforme estabelecido pela Resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde (CNS 1996).

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) foi explicado aos cadetes durante a consulta de avaliação antropométrica e foi assinado em duas vias pela pesquisadora e por todos os cadetes que aceitaram participar do estudo.

5 REFERÊNCIAS

AL-DAHI, S.; AL-KHASHAN, H.; AL MADEER, M. A. M.; AL-SAIF, K.; AL-AMRI, M. D. S.; AL-GHAMDI. Assessment of Framingham Cardiovascular Disease Risk Among Militaries in the Kingdom of Saudi Arabia. **Military Medicine**, Washington, v.178, n. 3, p. 299-305, 2013.

ALMEIDA, J. B.; MIRANDA, J. S.; MIYASAKI, S. C. S.; MARQUES, S. F.G.. **Prevalência e características do tabagismo na população universitária da região de Lins-SP**. Revista Brasileira de Enfermagem, **Brasília**, v.64, n.3, p. 545-550, 2011.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Primary Prevention of Coronary Disease: Guidance from Framingham: A Statement of Healthcare Professionals from the AHA Task Force on Risk Reduction. **Circulation**, Baltimore, n.97, p.1876-1887, 1998.

ANDERSON, K. M.; CASTELLI, W. P.; LEVY, D. Cholesterol and Mortality: 30 years of follow-up from the Framingham study. **The Journal of the Medical Association**, Atlanta, v. 257, p. 2176-2180, 1987.

ANDRADE, J. P.; ARNETT, D. K.; PINTO, F.; PIÑEIRO, D.; SMITH JR, S. C.; MATTOS, L. A. P.; MACHADO, C. A.; OLIVEIRA, G. M. M.; DOHMANN, H. F.; GIELEN, S. Sociedade Brasileira de Cardiologia - Carta do Rio de Janeiro - III Brasil Prevent / I América Latina Prevent. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 100, n. 1, p. 3-5, 2013.

BARBOSA, R. O.; SILVA, E. F. Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em Policiais Militares. **Revista Brasileira de Cardiologia**, Rio de Janeiro, v.26, n.1, p.45-53. 2013.

BARRETO, S. M; PASSOS, V. M. A. P.; GIATTI, L. Comportamento saudável entre adultos jovens no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 43, n. 2, p. 9-17, 2009.

BASIOTIS, P. P.; WELSH, S. O.; CRONIN, F. J.; KELSAY, J. L. Number of days of food intake records required to estimate individual and group nutrient intakes with defined confidence. **The Journal of Nutrition**, Bethesda, v.117, p. 1638–1641, 1987.

BERGMEYER, H. U. **Methods of Enzymatic Analysis**, Verlag Chemie, Weinheim, vol.2. New York: Academic Press, 1974. 549 p.

BEVILAQUA, C.; RADOVANOVIC, C. A. T.; AVELAR, F. S. R.; GIROTTO, P. C. M.; MARCON, S. S. Comportamentos de risco e prática de atividade física entre adolescentes universitários. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA CESUMAR, 2011. Anais. Maringá: Centro Universitário de Maringá, 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde VIGITEL Brasil 2009: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília (DF); 2010. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/publicacao_vigitel_2009.pdf. Acesso em: 20 abr. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde; Instituto Nacional do Câncer. Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não transmissíveis – Brasil: 15 capitais e Distrito Federal, 2002/2003. Rio de Janeiro: Inca; 2004. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/inquerito/docs/completa.pdf>. Acesso em 20 abr. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2009. Uma Análise da Situação de Saúde e da Agenda nacional e Internacional das Prioridades em Saúde. (Série G. Estatística e Informação em Saúde 1ª edição). Brasília: Ministério da Saúde; 2010. 368 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 236p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretrizes e Recomendações para o Cuidado Integral de Doenças Crônicas Não-Transmissíveis – Promoção de Saúde 2006, v. 8. Brasília: Ministério da Saúde; 2008. 72p.

BRAY, R. M.; PEMBERTON, M. R.; HOURANI, L. L.; WITT, M.; R. A. E. OLMSTED, K. L.; BROWN, J. M.; WEIMER, B.; LANE, M. E.; MARSDEN, M. E., SCHEFFLER, S., VANDERMAAS-PEELER, R., ASPINWALL, K. R.; ANDERSON, E.; SPAGNOLA, K.; CLOSE, K.; GRATTON, J. L.; CALVIN, S.; BRADSHAW, M. Department of Defense Survey of Health Related Behaviors Among Active Duty Military Personnel: A Component of the Defense Lifestyle Assessment Program (DLAP). Research Triangle Park, New York: Research Triangle Institute; RTI International. 2009. Disponível em: <http://www.tricare.mil/2008HealthBehaviors.pdf>. Acesso em 15 abr. 2012.

CAMBRI, L. T.; SOUZA, M.; MANNRICH, G.; CRUZ, R. O.; GEVAERD, M. S. Perfil lipídico, dislipidemias e exercícios. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, Florianópolis, v.8, n.3, p.100-106, 2006.

CARDOSO, A. P. Z.; NOGUEIRA, M. S.; HAYASHIDA, M.; SOUZA, L.; CESARINO, E. J. Aspectos clínicos e socioeconômicos das dislipidemias em portadores de doenças cardiovasculares. **Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 417-436, 2011.

CAWLEY, J.; MACLEAN, J. C. (2011): Unfit for service: The implications of rising obesity for US military recruitment, Discussion paper series // Forschungsinstitut zur

Zukunft der Arbeit, No. 5822. Disponível em: <http://nbn-resolving.de/> . Acesso em: 18 abr. 2013.

CEDERBERG, H.; MIKKOLA, I.; JOKELAINEN, J.; LAAKSO, M.; HÄRKÖNEN, P.; IKÄHEIMO, T.; LAAKSO, M.; KEINÄNEN-KIUKAANNIEM, S. Exercise during military training improves cardiovascular risk factors in young men. **Atherosclerosis**, Amsterdam, n. 216, p. 489–495, 2011.

CHAGAS, A. C. P. A.; ZILLI, E. C.; FERREIRA, J. F. M.; MORETTI, M. A.; RAMOS, R. F. Saúde Cardiovascular do Homem Brasileiro – Visão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, vol. 93, n. 6, p. 584-587, 2009.

COELHO, V. G.; CAETANO, L. F.; LIBERATORE JÚNIOR, R. D. R.; CORDEIRO, J. A.; SOUZA, D. R. S. Perfil lipídico e Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares em Estudantes de Medicina. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 85, n. 1, p. 57-61, 2005.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução nº196/96. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**, Brasília, p. 21082-2085, 16 out.1996.

COSTA, F. F.; MONTENEGRO, V. B.; LOPES, T. J. A.; COSTA, E. CS. Combinação de Fatores de Risco Relacionados à Síndrome Metabólica em Militares da Marinha do Brasil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 97, n.6, p. 485-492, 2011.

DA LUZ, C. R.; D'ANGELO, A. W.; LADEIRA, M. R.; CAMPOS, R. F.; PASCHOAL, V. A.; NICASTRO, H.; LANCH JR., A. H.; FREIBERG, C. K. Relação entre a prática de exercício físico e risco de doenças cardiovasculares. **Nutrire: Revista da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição**, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 1-14, 2011.

D'AGOSTINO, R. B.; PENCINA, M. J. Invited Commentary: Clinical Usefulness of the Framingham Cardiovascular Risk Profile Beyond Its Statistical Performance. **American Journal of Epidemiology**, Baltimore, v.176, n. 3, p. 187-189, 2012.

D'AGOSTINO, R. B.; PENCINA, M. J.; MASSARO, J. M.; COADY, S. Cardiovascular Disease Risk Assessment: Insights from Framingham. **Global Heart**, Oxford, v.8, n.1, p.11 - 23, 2013.

DAWBER, T. R.; GILCIN, F.; MEADORS, M. D.; MOORE, F. E. Epidemiological Approaches to Heart Disease: The Framingham Study. **American Journal of Public Health**, Washington, vol. 41, 1951.

DONADUSSI, C.; OLIVEIRA, A. F.; FATEL, E. C. S.; DICHÍ, J. B.; DICHÍ, I. Ingestão de lipídios na dieta e indicadores antropométricos de adiposidade em policiais militares. **Revista de Nutrição de Campinas**, Campinas, v. 22, n. 6, p.847-855, 2009.

DUQUIA, F. D. **Prevenção da doença aterosclerótica no militar**. 2010. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Aplicações Complementares às Ciências Militares) - Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2010.

FARIAS, N.; SOUZA, J. M. P.; LAURENTI, R.; ALENCAR, S. M. Mortalidade cardiovascular por sexo e faixa etária em São Paulo, Brasil: 1996 a 1998 e 2003 a 2005. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 93, n. 5, p. 498-505, 2009.

FERNANDES, R. A.; CHRISTOFARO, D. G. D.; CASONATTO, J.; CODOGNO, J. S.; RODRIGUES, E. Q.; CARDOSO, M. L.; KAWAGUTI, S. S.; ZANESCO, A. Prevalência de Dislipidemia em Indivíduos Fisicamente Ativos durante a Infância, Adolescência e Idade Adulta. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, n. 97, n. 4, p.317-323, 2011.

FERNANDES, R. A.; SPONTON, C. H. G.; ZANESCO, A. Atividade Física na Infância e na Adolescência Promove Efeitos Benéficos na Saúde de Adultos. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p.365-372, 2009.

FILION, K. B.; LUEPKER, R. V. Cigarette Smoking and Cardiovascular Disease: Lessons from Framingham, **Global Heart**, Oxford, v. 8, n. 1, p. 35–41, 2013.

FISBERG, R. M.; STELLA, R. H.; MORIMOTO, J. M.; PASQUALI, L. S.; PHILIPPI, S. T.; LATORRE, M. R. D. O. Perfil Lipídico de Estudantes de Nutrição e a sua Associação com Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v.76, n.2, p.137-142, 2001.

FONSECA, F. L.; BRANDÃO, A. A.; POZZAN, R.; CAMPANA, E. M. G.; PIZZI, O. L.; MAGALHÃES, M. E. C.; FREITAS, E. V.; BRANDÃO, A. P. Excesso de peso e o risco cardiovascular em jovens seguidos por 17 anos. Estudo do Rio de Janeiro. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 94, n. 2, p. 207-215, 2010.

FRIEDEWALD, W. T.; LEVY, R. I.; FREDRICKSON, D. S. Estimation of the Concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Plasma, Without Use of the Preparative Ultracentrifuge. **Clinical Chemistry**, Baltimore, v. 18, n. 6, p. 499-502, 1972.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, IPEA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. (2012). A Saúde no Brasil em 2030: Diretrizes Para a Prospecção Estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro. Rio de Janeiro: **Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República**. 2012.

GORDON-LARSEN, P.; ADAIR, L. S.; NELSON, M. C.; POPKIN, B. M. Five-year obesity incidence in the transition period between adolescence and adulthood: the National Longitudinal Study of Adolescent Health. **American Journal of Clinical Nutrition**, New York, v. 80, n. 3, p. 569-575, 2004.

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Proposição de equações para predição de gordura corporal em adultos jovens. **Semina**, Londrina, v. 12, n.6, p. 61-70, 1991.

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P. Composição corporal: princípios, técnicas e aplicações. In: _____. **Controle de peso corporal**. 2 ed. Rio de Janeiro: Shape, p. 78-117, 2003.

HARRISON, G. C.; BUSKIRK, E. R.; CARTER, J. E. L.; JOHNSTON, F. E.; LOHMAN, T. G.; POLLACK M. L.; ROCHE A. F.; WILMORE, J. Skinfold thicknesses and measurement technique. In: LOHMAN, T.G.; ROCHE, A.F.; MARTORELL. R. (Eds). **Anthropometric Standardization Reference Manual**. Champaign: Human Kinetics Books, p. 55-80, 1988.

INSTITUTE OF MEDICINE/FOOD AND NUTRITION BOARD. **Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids**. Washington: The National Academies Press, 2005a, 1331p.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008. Pesquisa Especial de Tabagismo (PETab)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 150 p.

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) 1989. Arquivo de dados da pesquisa. Brasília, 1990.

JAIME, P. C.; LATORRE, M. R. D. O. ; FORNÉS, N. A. S.; ZERBINI, C. A. F. Estudo comparativo entre dois métodos de ajuste energético do consumo de nutrientes. **Nutrire (SBAN)**, São Paulo, v. 26, p. 11-18, 2003.

KNAPIK, J. J.; CANHAM-CHERVAK, M.; HAURET, K.; HOEDEBECKE, E.; LAURIN, M. J.; CUTHIE, J. "Discharges during U.S. Army basic training: injury rates and risk factors." **Military Medicine**, Washington, v. 166, n. 7, p. 641-647, 2001.

KNAPIK, J. J.; SHARP, M. A.; DARAKJY, S.; JONES, S. B.; HAURET, K. G.; JONES, B. J. Temporal changes in the physical fitness of US Army recruits. **Sports Medicine**, Auckland, v. 36, n. 7, p. 613–634, 2006.

LHACHIMI, S. K.; NUSSELDER, W. J.; LOBSTEIN, T. J.; SMIT, H. A.; BAILI, P.; BENNETT, K.; KULIK, M. C.; JACKSON-LEACH, R.; BOSHUIZEN, H. C.; MACKENBACH, J. P. Modelling obesity outcomes: reducing obesity risk in adulthood may have greater impact than reducing obesity prevalence in childhood. **Obesity Reviews**, Oxford. doi: 10.1111/obr.12029, 2013.

LEAN, M. E. J.; HAN, T. S.; MORRISON, C. E. Waist circumference as a measure for indicating need for weight management. **British Medical Journal**, London, v. 311, p. 158-161, 1995.

LEITE, T. R. A.; SANTOS, B. R. M. Pressão arterial e estilo de vida de estudantes Universitários. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, São Caetano do Sul, n. 27, 2011.

LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. Anthropometric standardization reference manual. Abridged edition, 1991. p. 90

LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. **Anthropometric standardization reference manual**. Champaign: Human Kinetics Books, 1988.

LOPES, D. C. F. Tendência da aptidão física de cadetes da força aérea brasileira do ano de 1999 a 2009. **III Seminário de Estudos: Poder Aeroespacial e Estudos de Defesa**, 2010.

MCGRAW, L. K.; TURNER, B. S.; STOTTS, N. A.; KATHLEEN, A. D. A review of cardiovascular risk factors in US military personnel. **Journal of cardiovascular nursing**, Hagerstown, v. 23, n. 4, p. 338-344, 2008.

MACKAY, J.; GEORGE, A. M. The atlas of heart disease and stroke. Geneva: World Health Organization, 2004. 115 p.

MAROTTI, J.; GALHARDO, A. P. M.; FURUYAMA, R. J.; PIGOZZO, M. N.; CAMPOS, T. N.; LAGANÁ, D. C. Amostragem em Pesquisa Clínica : tamanho da amostra. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 186-194, 2008.

MARTINEZ, T. **Dislipidemias: da teoria à prática**. São Paulo: Atheneu, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE. Plano de ações para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011-2022. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2011.

MOREIRA, T. M. M.; GOMES, E. B.; SANTOS, J. C. Fatores de risco cardiovasculares em adultos jovens com hipertensão arterial e/ou diabetes *mellitus*. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, v. 31, n. 4, p.662-669, 2010.

MOSER, D. C.; MILANO, G. E.; BRITO, L. M. S.; TITSKI, A. C. K.; LEITE, N. Pressão arterial elevada, excesso de peso e obesidade abdominal em crianças e adolescentes. **Revista da Educação Física/UEM**, Maringá, v. 22, n. 4, p. 591-600, 2011.

MUNIZ, G. R. A capacitação física e a manutenção do controle do peso corporal nos militares da força aérea brasileira. **III Seminário de Estudos: Poder Aeroespacial e Estudos de Defesa**, 2010.

MUNIZ, L. C.; SCHNEIDER, B. C.; SILVA, I. C. M.; MATIJASEVICH, A. SANTOS, I. S. Fatores de risco comportamentais acumulados para doenças cardiovasculares no sul do Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, (versão online), março, 2012.

NATIONAL CHOLESTEROL EDUCATION PROGRAM (NCEP) EXPERT PANEL ON DETECTION, EVALUATION, AND TREATMENT OF HIGH BLOOD CHOLESTEROL IN ADULTS (ADULT TREATMENT PANEL III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. **Circulation**, Dallas, v. 106, p. 3143–3421, 2002.

NUNES, R. R.; CLEMENTE, E. L. S.; PANDINI, J. A.; COBAS, R. A.; DIAS, V. M.; SPERANDEI, S.; GOMES M. B. Confiabilidade da classificação do estado nutricional obtida através do IMC e três diferentes métodos de percentual de gordura corporal em pacientes com diabetes melito tipo 1. **Arquivos brasileiros de endocrinologia e metabologia**, São Paulo, v. 53, n. 3, p. 360-67, 2009.

OLINTO, M. T. A.; GIGANTE, D. P.; HORTA, B.; SILVEIRA, V.; OLIVEIRA, I.; WILLETT, W. Major dietary patterns and cardiovascular risk factors among young Brazilian adults. **European Journal of Nutrition**, Darmstadt, v. 51, n. 3, p. 281-291, 2012.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Obesidade: prevenindo e controlando a epidemia global**. São Paulo: Roceca, 2004.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. **Saúde nas Américas**. Washington: Organização Pan-Americana da Saúde/OMS, 2007.

PACKNETT, E. R.; NIEBUHR, D. W.; BEDNO, S. A.; COWAN, D. N. Body mass index, medical qualification status, and discharge during the first year of US Army service. **American Journal of Clinical Nutrition**, New York, v. 93, n. 3, p.608–614, 2011.

PASIAKOS, S. M.; KARL, J. P.; LUTZ, L. J.; MURPHY, N. E.; MARGOLIS, L. M.; ROOD, J. C.; CABLE, S. J.; WILLIAMS, K. W.; YOUNG, A. J.; MCCLUNG, J. P. Cardiometabolic Risk in US Army Recruits and the Effects of Basic Combat Training. **PLOS ONE**, San Francisco, v.7, n. 2, p. 1-7, 2012.

PEIXOTO, M. R. G.; BENÍCIO, M. H. D.; JARDIM, P. C. B. V. The relationship between body mass index and lifestyle in a Brazilian adult population: a cross-sectional survey. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 2694-2740, 2007.

PINTO, S. L.; SILVA, R. C. R.; PRIORE, S. E.; ASSIS, A. M. O.; PINTO, E. J. Prevalência de pré-hipertensão e de hipertensão arterial e avaliação de fatores associados em crianças e adolescentes de escolas públicas de Salvador, Bahia, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 6, p.1065-1076, 2011.

PINHO, C. P. S.; DINIZ, A. S.; ARRUDA, I. K. G.; BATISTA FILHO, M.; COELHO, P. C.; SEQUEIRA, L. A. S.; LIRA, P. I. C. Prevalência e fatores associados à obesidade abdominal em indivíduos na faixa etária de 25 a 59 anos do Estado de Pernambuco, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, p.313-324, 2013.

PRADO, E. S.; PEIXOTO, J. C.; SILVA, L. M. L.; PINHEIRO, J. C. S.; FERRÃO, M. L. D.; ALMEIDA, R. D.; MELO, L. A.; DANTAS, E. H. M. Dieta lipídica e sua relação com os níveis séricos lipídicos/lipoprotéicos em cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, Brasília, v.12, n.2, p. 57-62, 2004.

RAMIS, T. R.; MIELKE, G. I.; HABEYCHE, E. C.; OLIZ, M. M.; AZEVEDO, M. R.; HALLAL, P. C. Tabagismo e consumo de álcool em estudantes universitários: prevalência e fatores associados. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v.15, n.2, p. 376-385, 2012.

RAE OLMSTED, K. L.; BRAY, R. M.; REYES GUZMAN, C. M.; WILLIAMS, J.; KRUGER, H. Overlap in use of different types of tobacco among active duty military personnel. **Nicotine & Tobacco Research**, Abingdon, v.13, p. 691–698, 2011.

RIBEIRO, A. G.; COTTA, R. M. M.; RIBEIRO, S. M. R. A Promoção da Saúde e a Prevenção Integrada dos Fatores de Risco para Doenças Cardiovasculares. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.17, n.1, p.7-17, 2012.

ROCHA, P. B. **Presença de fatores de risco cardiovascular e nível de conhecimento nutricional em adolescentes do Ensino Médio de escolas públicas estaduais de Porto Alegre/RS**. 2011. 120 f. Dissertação (Curso de Pós-Graduação em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

RODRIGUES, M. E.; DOIMO, L. A.; MARINS, J. C. B. Perfil pressórico entre estudantes, professores e funcionários de uma universidade pública. **Revista do Instituto de Ciências da Saúde**, São Paulo, v. 29, n.1, p. 56-61, 2011.

SELASSIE, M.; SINHA, A. C. The epidemiology and aetiology of obesity: A global challenge. **Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology**, v. 25, n. 1, p. 1–9, 2011.

SILVA, C. L. **Consumo de frutas e hortaliças e conceito de alimentação saudável em adultos de Brasília**. 2011. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) – Faculdade de Ciências da Saúde – Universidade de Brasília, Brasília, 2011.

SIRI, W. E. Body composition from fluid space and density. In: BROZEC, J.; HANSCHER, A. (eds). **Techniques for measuring body composition**. Washington: National Academy of Sciences, 1961. p. 223-224

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. IV Diretriz Brasileira Sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2007). **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 88, n.1, 2007.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 95, n. 1, p. 1-51, 2010.

TALCOTT, G. W.; CIGRANG, J.; SHERRILL-MITTLEMAN, D.; SNYDER, D. K. BAKER, M.; TATUM, J.; CASSIDY, D.; SONNEK, S.; BALDERRAMA-DURBIN, C.; KLESGES, R. C.; EBBERT, J. O.; SLEP, A. M.; HEYMAN, R. E. Tobacco Use During Military Deployment. **Nicotine & Tobacco Research**, Abingdon, Advance Access published January 8, 2013.

TIROSH, A.; RUDICH, A.; SHOCHAT, T.; TEKES-MANOVA, D.; ISRAELI, E.; HENKIN, Y.; KOCHBA, I.; SHAI, I. Changes in Triglyceride Levels and Coronary Risk in Young Men. **Annals of Internal Medicine**, Philadelphia, v.147, n. 6, p.377-385, 2007.

TIROSH, A.; AFEK A, R. A.; PERCIK, R.; GORDON, B.; AYALON, N.; DERAZNE, E. TZUR, D.; GERSHNABEL, D.; GROSSMAN, E.; KARASIK, A.; SHAMISS, A.; SHAI, I. Progression of normotensive adolescents to hypertensive adults: a study of 26,980 teenagers. **Hypertension**, Dallas, v. 56, p. 203-209. 2010.

U.S.DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS) _____. **2008 Physical activity guidelines for Americans**. Atlanta: HHS, 2008. Disponível em: <www.health.gov/paguidelines/default.aspx>. . Acesso em 19 jun. 2013.

VASQUES, D. G.; LOPES, A. S. Fatores associados à atividade física e aos comportamentos sedentários em adolescentes. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 59-66, 2009.

WENZEL, D.; SOUZA, J. M. P.; SOUZA, S. B. Prevalência de hipertensão arterial em militares jovens e fatores associados. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, n. 43, v. 5, p. 789-795, 2009.

WOODRUFF, S. I.; CONWAY, T. L.; SHILLINGTON, A. M.; CLAPP, J. D.; LEMUS, H.; REED, M. B. Cigarette smoking and subsequent hospitalization in a cohort of young U.S. Navy female recruits. **Nicotine & Tobacco Research**, Abingdon, v. 12, n. 4, p. 365–373, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Tratamento de la hipertensión arterial: guía práctico para el médico y otros agentes de salud. Ginebra: World Health Organization, 1985.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Obesity*: preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization. Technical Report Series, 894p., 2000.

WORLD HEALTH ORGANIZATION; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION. Population nutrient intake goals for preventing diet-related chronic diseases. In: _____. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva: WHO, chap. 5, p. 54-60. (WHO Technical Report Series, 916), 2003.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva, 2004.

WORLD HEALTH ORGANIZATION /FIOCRUZ. Pesquisa Mundial de Saúde 2003. O Brasil em números. RADIS Comunicação em Saúde. 2004.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global status report on non communicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization, 2011.

YAMANE, G. K. Obesity in Civilian Adults : Potential Impact on Eligibility for U.S. Military Enlistment, **Military Medicine**, Washington, v.172, n.11, p.1160-1165, 2007.

YUSUF, S.; HAWKEN, S.; ÔUNPUU, S.; DANS, T.; AVEZUM, A.; LANAS, F.; MCQUEEN, M.; BUDAJ, A.; PAIS, P.; VARIGOS, J.; LISHENG, L. INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. **Lancet**, London, n. 364, p. 937-952, 2004.

**Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em Cadetes da
Academia da Força Aérea Brasileira**

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA

QUALIS CAPES B1 – NORMAS (Anexo 3)

Título completo do trabalho:

Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em Cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira

Título em inglês:

Cardiovascular risk factors in Cadets of the Brazilian Air Force Academy

Título resumido:

FRCV em cadetes da AFA

Descritores: fatores de risco; adulto; militares, doenças cardiovasculares.

Keywords: risk factors; adult; military personnel; cardiovascular diseases.

Autores*:

Fernanda Elisabete Hilgenberg, Érika Aparecida da Silveira, Cristiane Cominetti.

* Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás.

Resumo

Fundamento: Os fatores de risco cardiovascular (FRCV) acometem cada vez mais a população de adultos jovens, porém a prevalência não é conhecida entre cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira (AFA).

Objetivos: Determinar a prevalência de alguns FRCV e verificar a associação com gênero e ano de formação na AFA.

Métodos: Estudo observacional transversal que avaliou 166 cadetes, com idade entre 20 e 30 anos. Foram realizadas medidas antropométricas, parâmetros bioquímicos e clínicos, nível de atividade física, tabagismo e consumo alimentar. As análises estatísticas foram realizadas com os softwares STATA/SE versão 8.0 e SPSS versão 13.0. Os testes de Qui-Quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher foram empregados para avaliar a associação entre os FRCV, o gênero e o ano de formação. Dados do consumo alimentar foram ajustados ao valor energético. O nível de significância de 5% foi adotado como padrão.

Resultados: Verificou-se que 29,7% dos homens e 16,7% das mulheres apresentaram excesso de peso. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica (HAS) entre os homens foi de 15,2%. Quanto ao perfil lipídico, 50,7% dos cadetes apresentaram hipercolesterolemia, 24,3% apresentaram valores elevados de LDL-c e 11,2%, HDL-c baixa. Houve associação entre o tempo de permanência de Academia e HDL-c baixa. Dados do consumo mostraram consumo elevado de gorduras saturadas (87,2%) e colesterol (42,7%). Nenhum cadete atingiu as recomendações de gorduras mono e poli-insaturadas. A ingestão inadequada de fibras alimentares foi verificada em 92,7% dos cadetes.

Conclusão: Os jovens militares estão expostos a FRCV de maneira semelhante aos civis.

Abstract

Background: The cardiovascular risk factors (CVRF) increasingly affect the population of young adults, however the prevalence among cadets from the Air Force Academy (AFA) is not accordingly known.

Objective: To determine the prevalence of some CVRF in AFA cadets and verify the association among those factor with gender and year of entrance at AFA.

Methods: It was an observational cross-sectional study that evaluated 166 cadets, aged between 20 and 30 years. Assessment of anthropometric, biochemical and clinical parameters, physical activity, smoking habit and dietary risk factors for cardiovascular disease were taken. Statistical analysis was performed with STATA/SE version 8.0 and SPSS version 13.0. The Pearson Chi-Square or Fisher's exact tests were used to assess the association among CVRF, gender and the year of entrance at Academy. The food consumption data were adjusted to the energy. The significance level of 5% was adopted as standard.

Results: It was verified that 29.7% of men and 16.7% of women were overweight. The prevalence of hypertension among men was 15.2%. The lipid profile revealed that 50.7% of the cadets had hypercholesterolemia, 24.3% had elevated LDL-c and 11.2%, low HDL-c. There was a significant association between the time spent at AFA and low HDL-c. Food consumption data showed that there was a high prevalence of saturated fats (87.2%) and cholesterol (42.7%) intake. No cadet reached the recommendations for monounsaturated and polyunsaturated fat intake and the inadequate intake of dietary fiber was reported in 92.7% of them.

Conclusions: It was verified that the young military personnel are exposed to CVRF in a similar manner to civilians.

Introdução

As mudanças observadas nos padrões de estilo de vida da população contemporânea estão relacionadas aos processos de industrialização, urbanização e desenvolvimento econômico. Tais mudanças se refletem negativamente na saúde dos indivíduos, já que estão relacionadas a fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como hábitos alimentares inadequados, tabagismo, sedentarismo e ingestão nociva de álcool¹.

No ano de 2008, aproximadamente 63% das causas de morte no mundo foram atribuídas às DCNT, representadas por enfermidades como obesidade, doenças cardiovasculares (DVC), diabetes melito, câncer e doenças respiratórias crônicas¹.

Dentre as DCNT, as DCV e, conseqüentemente, os fatores de risco cardiovasculares (FRCV) representam as principais causas de mortalidade no mundo, totalizando 15,9 milhões de óbitos. No Brasil, verifica-se uma tendência declinante na mortalidade ocasionada por DCV, porém estas continuam sendo a principal causa de morte e hospitalizações no país, atingindo a marca de 31,3% de óbitos na população adulta².

As DCV são consideradas de natureza progressiva, pois a idade atua como um fator de risco significativo para o desenvolvimento da enfermidade³. No entanto, a prevalência de FRCV em estágios iniciais têm sido diagnosticada também em adultos jovens, fato constatado em pesquisa realizada em jovens americanos, onde mais de um terço da população de universitários já possui um ou mais fatores de risco para DCV³.

Assim como acontece com a população civil, o aumento na prevalência de fatores de risco para DCV em jovens também vem acometendo os militares das forças armadas, rotulados como uma população saudável, fisicamente ativa e com baixo risco de desenvolver DCNT⁴. Portanto, os objetivos deste estudo foram determinar a prevalência de FRCV e descrever a associação destes fatores com gênero e ano de formação na Academia da Força Aérea Brasileira (AFA).

Métodos

Realizou-se estudo observacional do tipo transversal no qual foram recrutados 175 jovens, porém dois cadetes foram desligados durante o curso, um cadete desistiu de participar e seis cadetes não compareceram à consulta de

avaliação nutricional. Portanto, a amostra final foi composta por 166 cadetes de ambos os gêneros, com idade entre 20 e 30 anos, matriculados na AFA, localizada na cidade de Pirassununga – SP, que não utilizassem fármacos com potencial de interferir no perfil bioquímico de lipídios séricos, que não apresentassem estados espoliativos, como infecção, inflamação, febre, estresse metabólico e diarreia e que não estivessem no período gestacional (para o gênero feminino).

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e aprovado conforme especificado em Parecer Consubstanciado (Protocolo nº 189/12). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi explicado aos cadetes durante a consulta de avaliação antropométrica e foi assinado em duas vias pela pesquisadora e por todos os cadetes que aceitaram participar do estudo.

A coleta dos dados foi realizada por meio de atendimento ambulatorial na Sala de Nutrição da Subdivisão de Saúde da AFA, conduzida pela pesquisadora. Durante o atendimento, procederam-se as medidas antropométricas (peso, estatura, circunferência da cintura, dobras cutâneas), e a aplicação de questionário sobre estilo de vida.

As medidas de peso (kg) e estatura (m) foram utilizadas para cálculo do índice de massa corporal (IMC), obtido por meio da divisão do valor do peso em quilogramas pela estatura em metros elevada ao quadrado. Os pontos de corte para classificação do IMC foram baseadas nas referências propostas pela *World Health Organization* (2000)⁵.

A avaliação da obesidade abdominal foi determinada a partir da circunferência da cintura, cuja medida foi aferida com fita métrica inelástica, dividida em centímetros, disposta no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela no momento da expiração⁵. A avaliação dos pontos de corte para circunferência da cintura foram baseados naqueles propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010)⁶, a saber: homens – menor que 94 centímetros e mulheres – menor que 80 centímetros.

As medidas das dobras cutâneas foram aferidas para determinação da adiposidade total em cadetes. A tomada das dobras foi realizada em triplicata por único antropometrista, a fim de conferir maior acurácia das medidas e evitar erros. Para medição das dobras utilizou-se o adipômetro da marca Sanny® (São Paulo, Brasil). As medidas foram aferidas de acordo com Guedes e Guedes (2003)⁷ e Harrison et al. (1988)⁸. Os cálculos utilizados para avaliar a densidade corporal (Dc)

e, posteriormente, o percentual de gordura corporal (% GC) foram baseados nas metodologias propostas Siri (1961)⁹ e Guedes e Guedes (1991)¹⁰, respectivamente. Os pontos de corte utilizados para avaliação de adequação do %GC foram: abaixo de 15% para os homens e abaixo de 23% para mulheres¹¹.

A avaliação do perfil lipídico sérico foi realizada no Laboratório da Subdivisão de Saúde da AFA, por meio de métodos colorimétricos enzimáticos¹², com utilização de kits das marcas Biotécnica® (Minas Gerais, Brasil) e Biosystems® (Paraná, Brasil). As leituras dos exames foram realizadas com utilização do analisador bioquímico Labmax Plenno, Labtest® (Minas Gerais, Brasil). O colesterol contido na fração HDL-c foi determinado após precipitação da LDL-c e da VLDL-c. As frações LDL-c e VLDL-c foram calculadas a partir da equação de Friedewald¹³, onde $LDL-c = \text{colesterol total (CT)} - (\text{VLDL-c} + \text{HDL-c})$; $VLDL-c = \text{triacilglicerol (TG)} / 5$. Os pontos de corte para interpretação dos resultados foram baseados nos parâmetros propostos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010)⁶ e para CT utilizou-se o valor proposto pelo *National Cholesterol Education Program/Adult Treatment Panel III* (2002)¹⁴.

A glicemia de jejum foi avaliada com metodologia enzimática colorimétrica automatizada, com utilização de kit da marca Biotécnica® (Minas Gerais, Brasil) e analisador bioquímico Labmax Plenno, Labtest® (Minas Gerais, Brasil). A concentração determinada como ponto de corte foi de 100 mg/dL⁶.

As pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram verificadas de acordo com as recomendações pertinentes⁶ e com a utilização de esfigmomanômetro analógico, marca Becton Dickinson do Brasil® (São Paulo, Brasil), calibrado pelo INMETRO. Neste estudo, optou-se por utilizar os valores limítrofes de PA para diagnóstico de HAS, cujos valores foram: maior ou igual a 130 mmHg para PAS e maior ou igual a 85 mmHg para PAD⁶, pois a população avaliada foi composta por jovens adultos e fisicamente ativos, fatores que não são considerados de risco para DCV⁶.

O nível de atividade física dos cadetes foi contabilizado em minutos/semana e mensurado de acordo com os relatos de atividades realizadas durante as aulas de Educação Física. A recomendação para prática de atividade física considera tempo maior ou igual a 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana¹⁵. O somatório abaixo de 150 minutos de atividades moderadas foi o ponto de corte utilizado para classificar os cadetes como

insuficientemente ativos ou sedentários¹⁵. Para quantificação da atividade física como moderada ou intensa utilizou-se a escala de Equivalentes Metabólicos (MET), onde os valores de MET de 3,0 a 5,9 são considerados como atividades moderadas e o MET acima de 6 representa atividade intensa¹⁶.

As informações sobre hábito de tabagismo foram quantificadas no questionário sobre estilo de vida dos cadetes, sendo considerados tabagistas os cadetes que relataram o hábito de fumar na coleta dos dados.

A avaliação do consumo alimentar constou de aplicação de registro alimentar de três dias não consecutivos, incluindo um dia de final de semana¹⁷ (dias alternados escolhidos pelos cadetes), onde cada participante registrou em um formulário todo seu consumo alimentar. Este formulário foi entregue aos cadetes durante as palestras explicativas sobre a pesquisa. Para cálculo e avaliação do consumo alimentar foi utilizado o software Avanutri® (Rio de Janeiro, Brasil), onde os dados foram inseridos no programa em forma de medidas caseiras, utilizando-se, ao final, a média de consumo alimentar dos três dias.

A avaliação da adequação do consumo dos macronutrientes e ingestão de fibras foi realizado com base nos pontos de corte propostos pela *World Health Organization* (2003)¹⁸. A adequação do perfil de ácidos graxos foi baseada nas últimas recomendações propostas pela I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular, emitida no ano de 2013¹⁹.

A análise estatística foi realizada com o auxílio dos softwares STATA/SE versão 8.0 e SPSS versão 13.0. Realizou-se análise descritiva dos dados e estes foram apresentados como média $\pm$ desvio padrão para variáveis contínuas ou em porcentagem para variáveis categóricas. Os testes de Qui-Quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher foram empregados para avaliar a associação entre os FRCV, o gênero e o ano de formação dos cadetes na AFA. O nível de significância de 5% foi adotado como padrão.

Para análise de associação entre os FRCV e o ano de formação dos cadetes optou-se por separá-los em duas turmas principais, uma composta por cadetes do 1º e 2º anos (mais jovens) e outra composta por cadetes do 3º e 4º anos (mais velhos).

Com o objetivo de refinar os dados do consumo alimentar, independentes da ingestão de energia, os valores de ingestão dos macronutrientes, gorduras saturadas, poli-insaturadas e monoinsaturadas, colesterol e fibra alimentar foram ajustados ao valor energético. Este procedimento foi realizado de acordo com o

método residual, que permite identificar a relação entre aspectos dietéticos e desenvolvimento de doenças crônicas sem a influência do consumo de energia²⁰.

Para verificação da adequação do tamanho amostral, o erro máximo foi determinado *a posteriori*. O intervalo de confiança foi de 95% e o poder do estudo foi 80%. A amostra de 166 cadetes foi considerada representativa da AFA por ter sido selecionada de maneira aleatória entre os cadetes que frequentavam os diferentes anos de ensino, de um total de 800 cadetes. O erro máximo permitido foi de 6,7%, considerando a prevalência do desfecho hipercolesterolemia.

As despesas para realização da pesquisa foram custeadas pela autora do estudo.

Resultados

Participaram da pesquisa 147 homens e 19 mulheres, representando as 4 turmas (anos) de formação da AFA, sendo 24 cadetes homens pertencentes ao 1º ano, 19 cadetes homens do 2º ano, 43 cadetes homens e 16 cadetes mulheres do 3º ano, 6 cadetes homens e 2 cadetes mulheres do 4º ano. A média ($\pm$ DP) de idade foi de $21,5 \pm 1,2$ para homens e $21,6 \pm 0,9$ para mulheres. A idade mínima observada foi de 19 anos e a máxima de 28 anos.

Verificou-se que a média de IMC para os dois gêneros manteve-se abaixo de $25,0 \text{ kg/m}^2$. Os valores médios para CT para ambos os gêneros permaneceram acima ao recomendado pelo NCEP/ATPIII (2002)¹⁴. As outras variáveis avaliadas apresentaram valores médios adequados de acordo com os pontos de corte baseados na Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010)⁶ (Tabela 1).

Tabela 1. Caracterização dos participantes da pesquisa, conforme gênero, Pirassununga-SP, 2013 (n=166).

Variáveis	Homens (n = 147)	Mulheres (n = 19)
Idade (anos)	21,5 ± 1,2	21,6 ± 0,9
Estatura (m)	1,76 ± 0,1	1,65 ± 0,1
Peso (kg)	74,9 ± 8,8	59,5 ± 8,2
IMC (kg/m ²)	24,0 ± 2,2	21,8 ± 2,2
Circunferência cintura (cm)	81,1 ± 8,8	74,2 ± 7,9
Gordura corporal (%)	11,1 ± 3,8	21,8 ± 3,4
Colesterol total (mg/dL)	151,4 ± 27,4	173,4 ± 46,9
HDL-c (mg/dL)	51,8 ± 10,3	71,4 ± 16,6
LDL-c (mg/dL)	87,1 ± 23,6	88,6 ± 32,8
VLDL-c (mg/dL)	12,2 ± 6,0	13,4 ± 7,1
Triacilgliceróis (mg/dL)	61,1 ± 30,1	67,1 ± 35,1
Glicemia (mg/dL)	86,9 ± 10,7	81,0 ± 4,9
PA sistólica (mmHg)	113,9 ± 14,7	99,2 ± 10,8
PA diastólica (mmHg)	72,6 ± 9,0	62,9 ± 10,7
Atividade física (min/semana)	513,8 ± 255,1	465,8 ± 188,9

Os dados são apresentados como média ± desvio-padrão.

Apesar da média de IMC para ambos os gêneros ser considerada adequada, verificou-se que 29,7% dos cadetes homens e 16,7% das mulheres apresentavam sobrepeso ou obesidade, de acordo com o IMC. Destaca-se ainda a prevalência de HAS entre os cadetes homens (15,2%). Quanto ao perfil lipídico foi constatado que 50,7% do total dos cadetes apresentaram hipercolesterolemia e 24,3%, valores elevados de LDL-c (Tabela 2).

Tabela 2. Prevalência de fatores de risco cardiovascular (FRCV) em cadetes da Academia da Força Aérea Brasileira em toda amostra segundo gênero; análise de associação dos FRCV com gênero, Pirassununga-SP, 2013 (n=166).

Fatores de risco	Prevalência de FRCV						p
	Amostra (n=166)		Masculino (n= 147)		Feminino (n= 19)		
	n	%	n	%	n	%	
Hipertensão arterial	22	13,4	22	15,2	0	0	0,054#
Obesidade abdominal	7	4,3	3	2,1	4	21,0	0,004#
Sobrepeso ou obesidade	44	28,2	41	29,7	3	16,7	0,192#
Adiposidade total	25	17,5	21	16,5	4	25,0	0,296#
Hipercolesterolemia	73	50,7	61	48,8	12	63,2	0,243*
Hipertrigliceridemia	4	2,8	3	2,4	1	5,3	0,243#
HDL-c baixa	12	8,3	12	9,6	0	0	0,170#
LDL-c elevada	35	24,3	30	24,0	5	26,3	0,826*
Glicemia de jejum alterada	1	0,7	1	0,8	0	0	0,867#
Sedentarismo	8	4,8	7	4,8	1	5,3	0,633#
Tabagismo	7	4,2	7	4,8	0	0	0,418#

*Teste qui-quadrado de Pearson ou # Teste Exato de Fisher. Exames bioquímicos n =144.

Verificou-se associação significativa entre o tempo de permanência (ano de formação) de Academia e HDL-c baixa. A prevalência de HDL-c baixa foi estatisticamente maior entre os cadetes do 1º e 2º anos (Tabela 3).

Tabela 3. Prevalência e análise de associação de fatores de risco cardiovascular (FRCV) com ano de formação dos cadetes (n=166) na Academia da Força Aérea Brasileira, Pirassununga-SP, 2013.

Fatores de risco	Prevalência de FRCV				p
	1º e 2º anos (n= 64)		3º e 4º anos (n= 102)		
	n	%	n	%	
Hipertensão arterial	9	14,5	13	12,8	0,747*
Obesidade abdominal	1	1,6	6	6,1	0,164*
Sobrepeso peso ou obesidade	19	31,7	25	28,2	0,448*
Adiposidade total	9	15,0	16	19,3	0,506*
Hipercolesterolemia	29	45,3	44	55,0	0,248*
Hipertrigliceridemia	1	1,6	3	3,8	0,398*
HDL-c baixa	11	17,2	1	1,2	0,001#
LDL-c elevada	17	26,6	18	22,5	0,572*
Glicemia de jejum alterada	0	0	1	1,2	0,999#
Sedentarismo	2	3,1	6	5,9	0,336#
Tabagismo	4	6,2	3	3,0	0,263#

*Teste qui-quadrado de Pearson ou # Teste Exato de Fisher. Exames bioquímicos n=144.

Os resultados da avaliação do consumo alimentar indicaram que o percentual de indivíduos que apresentou ingestão superior à necessidade diária foi de 58,7% para os homens e 50% para as mulheres. Há que se ressaltar o elevado consumo de gordura saturada (87,2%) e colesterol (42,7%) pelos cadetes de ambos os gêneros. Destaca-se também a baixa ingestão de gorduras do tipo mono e poli-insaturada, pois 100% dos cadetes não atingiram as recomendações para estes dois tipos de gordura. A ingestão inadequada de fibras foi constatada em 92,3% dos homens e em 94,4% das mulheres (Tabela 4).

Tabela 4. Prevalência de consumo de risco para doenças cardiovasculares entre os cadetes da Academia da Força Aérea (n=110), Pirassununga-SP, 2013.

Nutrientes	Prevalência de consumo de risco para DCV						Valor p*
	Amostra (n=110)		Masculino (n=92)		Feminino (n= 18)		
	n	%	n	%	n	%	
VET superior à necessidade	63	57,2	54	58,7	9	50	0,49*
Proteínas (> 15% VET)	82	74,5	75	81,5	7	38,8	0,0001*
Carboidratos (> 75% VET)	5	4,54	3	3,2	2	11,1	0,14*
Lipídios (> 30 % VET)	69	62,7	56	60,8	13	72,2	0,36*
Saturados (≥ 7% VET)	96	87,2	80	86,9	16	88,8	0,01*
Monoinsaturados (> 20% VET)	110	100	92	100	18	100	0,99*
Poli-insaturados (< 10% VET)	110	100	92	100	18	100	0,99*
Colesterol (> 300 mg)	47	42,7	44	47,8	3	16,6	0,01*
Fibra alimentar (< 25 g)	102	92,7	85	92,3	17	94,4	0,75*

*Teste qui-quadrado de Pearson.

Discussão

Esta pesquisa se propôs a identificar a prevalência de alguns FRCV em cadetes da AFA e determinar a associação entre estes fatores de risco, o gênero, e o ano de formação na Academia. Embora esta população seja considerada saudável, os resultados encontrados neste estudo evidenciaram prevalência importante de HAS, excesso de peso, adiposidade total, hipercolesterolemia, LDL-c elevada, ingestão elevada de gordura saturada, baixa ingestão de gorduras mono e poli-insaturadas, além da baixa ingestão de fibras.

A prevalência de HAS foi constatada apenas em homens (15,2%). Tal resultado é relevante no sentido de que a média de idade destes jovens não é considerada fator de risco para desenvolvimento de HAS, aliado ao fato desta população ser considerada bastante ativa. Este resultado foi superior ao observado no estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), onde a prevalência de HAS foi de 7,5% entre jovens de 18 aos 24 anos de idade²¹. Por outro lado, a prevalência de HAS em policiais militares com idades entre 20 a 54 anos, no Rio Grande do Sul, foi de 40% para os

homens²². Em militares homens da Força Aérea de São Paulo (n=380) com idades entre 19 e 35 anos, a prevalência de HAS foi de 22%²³.

Neste estudo houve prevalência elevada de hipercolesterolemia e LDL-c aumentada entre os cadetes. Este resultado é relevante dada à relação entre as dislipidemias e a gênese da aterosclerose²⁴. Resultados semelhantes têm sido verificados entre militares, a exemplo da pesquisa realizada com indivíduos belgas com idades entre 20 e 56 anos, onde a prevalência de hipercolesterolemia foi de 56% em homens²⁵. No Brasil, Barbosa e Silva (2013)²² diagnosticaram prevalência de dislipidemia em 54% dos policiais militares com faixa etária de 20-54 anos, no estado do Rio Grande do Sul.

Os valores baixos de HDL-c foram associados positivamente ao ano de ingresso na AFA, com maior prevalência entre os cadetes dos 1º e 2º anos. Este resultado pode ser explicado pelo maior tempo dedicado à atividade física entre os cadetes dos 3º e 4º anos, pois estes são praticantes de atividade física diária há mais tempo que os cadetes mais jovens. Existem evidências de que adultos fisicamente ativos apresentam maiores concentrações plasmáticas de HDL-c, menores concentrações de LDL-c e de TG quando comparados aos indivíduos sedentários²⁶.

Neste estudo constatou-se que parte importante dos jovens militares foi diagnosticada com sobrepeso e obesidade, segundo o IMC. Embora o IMC seja bastante utilizado como método de avaliação corporal, este índice pode fornecer uma estimativa imprecisa quanto à composição de massa de gordura e massa magra, ocasionando resultados falso-positivos²⁷. Entretanto, estes dados foram corroborados pela prevalência de adiposidade total, a qual foi de 17,5%, avaliada por meio das dobras cutâneas.

Resultados semelhantes sobre o excesso de peso têm sido registrados pelas Forças Armadas em todo mundo. Nos Estados Unidos, o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade em militares atingiu a marca de 60%, percentual que representa o dobro da prevalência de obesidade estimada em 1980²⁸. Em pesquisa com 5000 militares belgas (homens, com idade entre 20 a 56 anos), 15,3% foram diagnosticados com obesidade e 43,1% com sobrepeso²⁵. No Brasil, em pesquisa realizada com 426 militares homens (idade média de 30 anos), houve prevalência de 51,6% de sobrepeso e 12,9% de obesidade²⁹.

Em comparação aos dados mostrados pela POF 2008-2009, verifica-se uma tendência similar quanto à prevalência de excesso de peso (27,3%) em adultos com idade entre 20 a 24 anos. Porém, na faixa etária entre 25 a 29 anos, a prevalência de excesso de peso foi superior entre os adultos avaliados pela POF (38,2%)³⁰.

A prevalência de obesidade abdominal foi elevada nas mulheres e positivamente correlacionada com este gênero. O tecido adiposo visceral está associado a distúrbios metabólicos como alterações desfavoráveis no perfil das lipoproteínas plasmáticas, além de sua correlação direta na gênese dos eventos coronarianos³¹. Aliado a este resultado, verificou-se que a prevalência de adiposidade total foi superior nas cadetes mulheres (25%), enquanto os homens atingiram a prevalência de 16,5%. A adiposidade maior entre as mulheres pode ser explicada devido à maior quantidade de tecido adiposo acumulada na região glúteo-femural, além da influência dos hormônios esteroides sexuais femininos, que tem papel no acúmulo de tecido adiposo³².

Houve presença de tabagismo apenas entre os homens, a qual foi considerada baixa. Em pesquisa sobre o diagnóstico de FRCV envolvendo 10.500 militares na Arábia Saudita verificou-se a prevalência de tabagismo em 35% dos avaliados⁴. A prevalência de tabagismo também foi verificada em 20% de militares homens da Marinha norte-americana. Esta mesma pesquisa revelou que os militares fumantes apresentaram diminuição da aptidão cardiorrespiratória quando comparados aos não fumantes³³. O combate ao tabagismo é a medida mais importante no controle das DCV, pois os componentes do cigarro atuam diretamente sobre as células endoteliais, diminuindo a vasodilatação e, além disso, aumentam as concentrações de monóxido de carbono sanguíneo e a PA³⁴.

No presente estudo, o tempo dedicado à prática de exercícios físicos entre os cadetes foi bastante satisfatório. Esse resultado demonstra uma prática bastante comum nas escolas militares brasileiras, onde a Educação Física é disciplina obrigatória da grade curricular. A prática de atividade física é considerada pilar essencial na redução do risco das DCNT, bem como na promoção de qualidade de vida³⁵.

O consumo alimentar dos cadetes chamou a atenção pela ingestão elevada de lipídios, principalmente pelo alto consumo de gorduras saturadas e colesterol e baixa ingestão de gorduras dos tipos mono e poli-insaturadas. Estes resultados foram semelhantes aos dados apontados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares

(POF 2008-2009), onde a prevalência de inadequação de ingestão de gorduras saturadas atingiu 82% dos homens e 87% nas mulheres, na faixa etária entre 19 e 59 anos³⁰.

Além do consumo elevado de lipídios, os resultados deste estudo demonstraram o baixo consumo de fibras alimentares por parte dos cadetes. Estes resultados vão ao encontro das mudanças observadas no padrão alimentar da população brasileira nas últimas duas décadas, caracterizado pelo elevado consumo de gorduras saturadas e de açúcares, além de ingestão de alimentos com baixo teor de fibras alimentares³⁰. De acordo com resultados da POF, o percentual de inadequação para o consumo de fibras atingiu 71% dos homens e 75% das mulheres brasileiras na faixa etária entre 19 a 59 anos³⁰.

O consumo alimentar de jovens militares revela que esta população vem adotando hábitos pouco saudáveis quando se trata das escolhas alimentares, com elevada ingestão de alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares e baixa ingestão de frutas, hortaliças, leguminosas e, conseqüentemente, de fibras alimentares³. Em pesquisa sobre hábitos alimentares de militares americanos, foi constatado que os 209 jovens avaliados não atingiram as recomendações quanto ao consumo ideal de gordura total e saturada, fibras, frutas e vegetais³.

É importante ressaltar que durante a fase ativa do serviço militar, muitos jovens utilizam alimentos altamente calóricos como fonte de recompensa³⁶. Os resultados sobre o consumo alimentar dos cadetes da AFA corroboram com esta afirmação, visto que estes jovens apresentaram elevado consumo de alimentos fonte de gordura e baixo de alimentos fontes de fibra alimentar.

No Brasil, Olinto e col. (2012)³⁷ avaliaram a relação entre os hábitos alimentares e o risco cardiovascular entre 4202 jovens adultos com média de idade de 23 anos na cidade de Pelotas (RS). A pesquisa concluiu que os hábitos alimentares característicos da dieta brasileira (composta por açúcar, pão branco, café, manteiga/margarina, arroz e feijão preto) foram associados a baixas concentrações de colesterol total e LDL-c, PA sistólica e diastólica menores, quando comparados com a dieta baseada em alimentos processados (composta por carne vermelha, salgadinhos, batata frita, cerveja e refrigerante), associada ao aumento do IMC, da circunferência da cintura e das concentrações de LDL-c.

O padrão alimentar inadequado entre os adultos jovens constatado nesta pesquisa e em outras evidências científicas é preocupante do ponto de vista de

saúde pública, visto que a alimentação inadequada exerce papel essencial sobre e incidência da obesidade e outras DCNT, como as DCV³⁸. O maior fator de impacto relacionado à prevalência de obesidade e sobrepeso entre os militares americanos deve-se aos hábitos alimentares, caracterizados pela ingestão insuficiente de frutas, vegetais e fibra alimentar³⁸.

Como limitações do estudo pode-se citar a dificuldade enfrentada no recrutamento dos cadetes, sendo que um número importante deles não completou o protocolo de avaliações clínicas e/ou bioquímicas (n=22) e 56 não preencheram o formulário de consumo alimentar.

Conclusões

Os resultados apresentados evidenciaram que a amostra composta por jovens cadetes da AFA está exposta a alguns FRCV importantes, com percentuais significativos de inadequação em variáveis antropométricas, bioquímicas, clínicas, além de prevalência de hábitos alimentares inadequados. Este cenário está alinhado a diversas evidências científicas de que os FRCV estão acometendo indivíduos cada vez mais jovens, em consequência das mudanças do estilo de vida dos jovens brasileiros.

Há, portanto, urgência na instituição de programas de educação em saúde e nutricional para esta população, a fim de evitar e/ou reduzir a incidência dos FRCV em uma população de adultos jovens, assegurando assim melhor qualidade de vida e diminuição de agravos à saúde cardiovascular em longo prazo.

Potencial Conflito de Interesses

Declaro não haver conflitos de interesses pertinentes.

Agradecimentos:

Aos cadetes voluntários da pesquisa e ao Comando do Corpo de Cadetes da Academia da Força Aérea.

Referências

1. World Health Organization. Global status report on non communicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization, 2011.
2. Fundação Oswaldo Cruz, Ipea, Ministério Da Saúde, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. (2012). A Saúde no Brasil em 2030: Diretrizes Para a Prospecção Estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 2012.
3. Pasiakos SM, Karl JP, Lutz LJ, Murphy NE, Margolis LM, Rood JC, et al. Cardiometabolic Risk in US Army Recruits and the Effects of Basic Combat Training. PLoS ONE 2012; 7(2): 1-7.
4. Al-Dahi S, Al-Khashan H, Al Madeer MAM, Al-Saif K, Al-Amri MDS, Al-Ghamdi, et al. Assessment of Framingham Cardiovascular Disease Risk Among Militaries in the Kingdom of Saudi Arabia. Mil. med. 2013; 178 (3): 299-305.
5. World Health Organization. *Obesity*: preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO Consultation. Geneva: World Health Organization. Technical Report Series, 2000; p 894.
6. Sociedade Brasileira de Cardiologia/Sociedade Brasileira de Hipertensão/Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95 (1): 1-51.
7. Guedes DP, Guedes JERP. Composição corporal: princípios, técnicas e aplicações. In: _____. Controle de peso corporal. 2 ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. p. 78-117.
8. Harrison GC, Buskirk ER, Carter JEL, Johnston FE, Lohman TG, Pollack ML, et al. Skinfold thicknesses and measurement technique. In: Lohman TG, Roche AF, Martorell R. (Eds). Anthropometric Standardization Reference Manual. Champaign: Human Kinetics Books, 1988. p. 55-80.
9. Siri WE. Body composition from fluid space and density. In: Brozek J, Hanschel A. (eds). Techniques for measuring body composition. Washington: National Academy of Sciences, 1961. p. 223-24.
10. Guedes DP, Guedes JERP. Proposição de equações para predição de gordura corporal em adultos jovens. Semina 1991; 12 (6): 61-70.
11. Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometric standardization reference manual. Abridged Edition. Champaign: Human Kinetics Books; 1991. p. 90.
12. Bergmeyer HU. Methods of Enzymatic Analysis, Verlag Chemie, Weinheim, vol.2. Academic Press: New York, 1974. 549 p.

13. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the Concentration of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Plasma, Without Use of the Preparative Ultracentrifuge. Clin Chem. 1972; 18 (6):499-502.
14. National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation 2002; 106: 3143–421.
15. World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: WHO; 2010.
16. U.S.Department Of Health And Human Services (HHS) _____. 2008 Physical activity guidelines for Americans. Atlanta: HHS, 2008. Disponível em: <www.health.gov/paguidelines/default.aspx>. Acesso em: 19 jun. 2013.
17. Basiotis PP, Welsh SO, Cronin FJ, Kelsay JL, Mertz W. Number of days of food intake records required to estimate individual and group nutrient intakes with defined confidence. J Nutr 1987; 117 (9): 1638–41.
18. World Health Organization; Food And Agriculture Organization. Population nutrient intake goals for preventing diet-related chronic diseases. In:_____. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Geneva: WHO, 2003, chap. 5, p. 54-60. (WHO Technical Report Series, 916).
19. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular. Arq Bras Cardiol. 2013; 100(.3):1-40.
20. Jaime PC, Latorre MRDO, Fornés NAS, Zerbini CAF. Estudo comparativo entre dois métodos de ajuste energético do consumo de nutrientes. Nutrire. 2003; 26: 11-18.
21. BRASIL. Ministério da Saúde VIGITEL Brasil 2009: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília (DF); 2010. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/publicacao_vigitel_2009.pdf. Acesso em: 20 abr. 2012.
22. Barbosa RO, Silva EF. Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em Policiais Militares. Rev Bras Cardiol. 2013;26 (1):45-53.
23. Wenzel D, Souza JMP, Souza SB. Prevalência de hipertensão arterial em militares jovens e fatores associados. Rev. Saúde Pública 2009; 43 (5): 789-95.
24. Sociedade Brasileira de Cardiologia. IV Diretriz Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2007). Arq Bras Cardiol 2007; 88 (1): 1-19.
25. Mullie P, Clarys P, Hulens M, Vansant G. Distribution of Cardiovascular Risk Factors in Belgian Army Men. Arch Environ Occup Health 2010; 65(3):135-9,

26. Guedes DP, Goncalves LAVV. Impacto da prática habitual de atividade física no perfil lipídico de adultos. *Arq. bras. endocrinol. metab.* 2007; 51(1): 72-8.
27. Nunes RR, Clemente ELS, Pandini J, Cobas RA, Dias VM, Sperandei S, Gomes MB. Confiabilidade da classificação do estado nutricional obtida através do IMC e três diferentes métodos de percentual de gordura corporal em pacientes com diabetes melito tipo 1. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2009, 53(3): 360-67,2009.
28. Shrestha M, Combest T, Fonda SJ, Alfonso A, Guerrero A. Effect of an Accelerometer on Body Weight and Fitness in Overweight and Obese Active Duty Soldiers. *Mil Med.* 2013;178(1):82-7.
29. Neves EB. Prevalência de sobrepeso e obesidade em militares do exército brasileiro: associação com a hipertensão arterial. *Ciênc. saúde coletiva* 2008; 13(5):1661-1668.
30. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de orçamentos familiares 2008-2009: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 150 p.
31. Mendes WAA, Carmin SEM, Pinho PM, Silva ACM, Machado LMM, Araújo MS. Relação de Variáveis Antropométricas com os Perfis Pressórico e Lipídico em Adultos Portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. *Rev Bras Cardiol.* 2012; 25 (3): 200-09.
32. Lopes AS, Nahas MV, Duarte MFS, Pires Neto CS. Distribuição de gordura corporal subcutânea índices de adiposidade de indivíduos de 20 a 67 anos de idade. *Rev. bras. ativ. fís. Saúde* 1995; 1(2): 15-26.
33. Macera CA, Aralis HJ, Andrew JM, Rauh MJ, Han PP, Galarneau MR. Cigarette Smoking, Body Mass Index, and Physical Fitness Changes Among Male Navy Personnel. *Nicotine Tob Res.* 2011; 13 (10): 965-71.
34. Kelarijani, RB, Saleh, DK, Dadjoo, Y, Naseri, MH, Naserbakht, M, Kabir, A, Pourmansouri, L, Premature coronary artery disease in military and non-military individuals. *ARYA Atheroscler*, 2007; 3(3):157-61.
35. Teixeira CF, Pereira EF. Aptidão Física, Idade e Estado Nutricional em Militares. *Arq Bras Cardiol* 2010; 94(4):438-43.
36. Bingham, CML, Lahti-Koski, M, Puukka, P, Kinnunen, M, Jallinoja, P, Absetz, P. Effects of a healthy food supply intervention in a military setting: positive changes in cereal, fat and sugar containing foods. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2012; 9 (91): 1-11.
37. Olinto MTA, Gigante DP, Horta B, Silveira V, Oliveira I, Willett W. Major dietary patterns and cardiovascular risk factors among young Brazilian adults. *Eur J Nutr.* 2012; 51(3): 281–91.

38. Crombie, AP, LesLee K, Funderburk, Tracey J, Smith SM, McGraw, LAW, et al. Effects of Modified Foodservice Practices in Military Dining Facilities on Ad Libitum Nutritional Intake of US Army Soldiers. J Acad Nutr Diet. 2013; 20 (10):1-8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho permitiu uma investigação mais aprofundada sobre o estilo de vida e a prevalência dos FRCV nos cadetes brasileiros, mais especificamente àqueles pertencentes à Força Aérea, pouco divulgada no país.

Os cadetes avaliados atingiram, em sua maioria, a recomendação proposta pela OMS quanto à prática de atividade física, visto que as aulas de Educação

Física são obrigatórias na Academia. Entretanto, mesmo com a prática intensa de atividade física, houve prevalência significativa de excesso peso, de PA elevada e de dislipidemias.

Os resultados desta pesquisa revelaram que os jovens militares estão expostos a alguns fatores de risco para DCV de maneira semelhante aos jovens civis. Esta conclusão é preocupante, visto que a população de militares é rotulada por cultivar hábitos de vida saudáveis. Aliado a este fato, sabe-se que a profissão militar exige de seu efetivo uma condição física adequada para realização de suas atividades.

A avaliação do consumo alimentar indicou ingestão elevada de lipídios e baixo consumo de fibras. Apesar deste estudo não contemplar uma análise referente à ingestão dos grupos de alimentos, verificou-se durante a conferência dos formulários de registro alimentar dos cadetes que a grande maioria apresentava elevada ingestão de alimentos do tipo *fast food*, como sanduíches, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, massas congeladas, alimentos empanados, refrigerantes e doces em geral, em detrimento da ingestão de alimentos como frutas, legumes, verduras, cereais, leite e derivados. Este padrão de ingestão alterado foi justificado por muitos deles devido à falta de tempo e às preferências alimentares. Percebe-se que muitos jovens deste estudo possuem algum conhecimento acerca de hábitos alimentares mais saudáveis, porém o estilo de alimentação rápida e de elevada densidade calórica torna-se uma opção mais prática para suas necessidades de rotina acadêmica.

Em face dos resultados verifica-se a necessidade de atuação de uma equipe de saúde multidisciplinar, que possa desenvolver medidas de detecção precoce, prevenção e tratamento dos FRCV. A intervenção nutricional neste grupo populacional poderia ser realizada por meio de palestras esclarecedoras acerca dos benefícios relacionados à adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, ou até mesmo a criação de grupos de orientação nutricional no âmbito da Seção de Educação Física da AFA, que estimulem os cadetes a conhecer mais a fundo as recomendações propostas atualmente no Brasil, tais como o Guia Alimentar para População Brasileira e os 10 Passos para uma Alimentação Saudável, emitidos pelo Ministério da Saúde.

Por fim, acredita-se que a detecção precoce e a instituição de medidas eficazes de educação nutricional possam auxiliar na promoção da saúde cardiovascular dos futuros oficiais da Força Aérea Brasileira.

APÊNDICES

Apêndice 1 – Questionário de coleta de dados

Nome: _____

Número no estudo: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Gênero: masculino () feminino ()

Data da avaliação: ____/____/____

1- MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS E EXAMES LABORATORIAIS

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	VALOR	AVALIAÇÃO
Estatura (m)		
Peso (kg)		
Índice de massa corporal (Kg/m ²)		

DOSAGENS SÉRICAS	VALOR	AVALIAÇÃO
Glicemia		
Colesterol Total		
HDL-c		
LDL-c		
VLDL -c		
Triglicérides		

2- AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

Data: ____/____/____

Valores 1ª medida : _____ mm/Hg

Valores 2ª medida : _____ mm/Hg

Comentários:

3- ANTECEDENTES FAMILIARES

Pai () vivo () falecido. Causa da morte: _____

Mãe () vivo () falecido. Causa da morte: _____

Total de irmão(s): _____ vivo (s): _____

Irmão(s) falecido(s). Causa(s) da morte: _____

Alguém da sua família tem ou já teve uma das doenças indicadas abaixo?

HAS	DM	ANGINA	INFARTO	AVC	MORTE SÚBITA
Sim ()	Sim ()	Sim ()	Sim ()	Sim ()	Sim ()
Não ()	Não ()	Não ()	Não ()	Não ()	Não ()
Não sabe ()	Não sabe ()	Não sabe ()	Não sabe ()	Não sabe ()	Não sabe ()
Pai ()	Pai ()	Pai ()	Pai ()	Pai ()	Pai ()
Mãe ()	Mãe ()	Mãe ()	Mãe ()	Mãe ()	Mãe ()
Irmãos nº ()	Irmãos nº ()	Irmãos nº ()	Irmãos nº ()	Irmãos nº ()	Irmãos nº ()
Outros _____	Outros _____	Outros _____	Outros _____	Outros _____	Outros _____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

4- ATIVIDADE FÍSICA

Faz exercício físico? () sim () não

Tipo de atividade física praticada	Frequência semanal	Duração diária	Há quanto tempo pratica?

5- TABAGISMO

5.1- É fumante atualmente? () sim () não

Fuma que tipo de cigarro? () palha () papel com filtro () charuto () outro

Se cigarro de palha, quantos fuma/dia? _____

Se cigarro de papel com filtro, quantos fuma/dia? _____

Se charuto, quantos fuma/dia? _____

Há quanto está fumando? _____

5.2- Se não fuma atualmente, responder as seguintes questões:

Já foi fumante? () sim () não

Em caso afirmativo, fumava que tipo de cigarro? () palha () papel c/ filtro () charuto () outro _____

Fumou durante quanto tempo? _____

Há quanto tempo parou de fumar? _____

Quantidade de cigarro que fumava/dia? _____

Qual razão peça qual deixou de fumar? () doença () economia () outra(s):

6- CONSUMO DE BEBIDA ALCÓOLICA

6.1- Faz uso de bebida alcoólica atualmente: () sim () não

Caso afirmativo, responder às questões abaixo:

Tipo de bebida	Frequência semanal	Quantidade	Há quanto tempo faz uso?

6.2- Se não bebe, responder as questões abaixo:

Já fez uso de algum tipo de bebida alcoólica? () sim () não

Caso afirmativo, responder as questões seguintes:

Tipo de bebida	Por quanto tempo fez uso	Há quanto tempo parou?

Razões pelas quais parou de ingerir bebida alcoólica? () doença () economia ()
outra(s): _____

Apêndice 2 – Formulário para avaliação do consumo alimentar

TÍTULO DO ESTUDO

PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR
EM CADETES DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

Fernanda Elisabete Hilgenberg

Universidade Federal de Goiás

(0**19) 3565-7432

(0**19) 8125-9647

Neste caderno estão algumas orientações sobre o estudo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente com a pesquisadora ou pelo telefone:

(0 ** 19) 8125-9647.

INFORMAÇÕES PESSOAIS

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

IDADE: _____

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

PESO: _____ Kg

ESTATURA: _____ cm

IMC: _____

ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE SANGUE

A coleta de sangue será no dia ____/____/____

Local: _____

COLETA DE SANGUE:

Venha em jejum de 12 horas.

Serão coletados 15 mL de sangue por profissional competente.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE 24 HORAS

- Anotar todos os alimentos consumidos durante o dia e a noite, desde a hora em que acordar até a hora em que for dormir.

Se você se alimentar durante a madrugada, deve anotar no registro! E também as balas, chicletes, salgadinhos, pirulitos, etc.

- Anotar os horários das refeições.

- Anotar a quantidade de alimentos consumidos, na forma de medidas caseiras:

- **colheres** (de sopa, de arroz, de sobremesa, de chá, de café), **concha**, **escumadeira**, **copo** (americano, de requeijão), **xícara** (de chá, de café), **prato** (raso, de sopa, pires ou de sobremesa).

- Marcar se o alimento é frito, cozido, grelhado ou na chapa, ensopado, à milanesa, empanado.

- Anotar preparações que utilizem mais de um ingrediente. Ex: sopa de legumes (anotar os legumes e ingredientes complementares).

- Descrever o tipo de alimento, com muitos detalhes, por exemplo:

- **leite** (desnatado, integral, tipo B, tipo C, de caixinha ou saquinho e a marca)

- **pão** (francês, de fôrma, de leite, doce, de mel, caseiro, industrializado e qual a marca)

- **iogurte** (o tipo, se é desnatado ou não, a marca e o sabor)

- **feijão** (carioca ou preto, só o caldo, só o grão, ½ a ½ de cada)

- **bolachas** (recheadas, sem recheio, o sabor, a marca)

- **gelatina** (anotar o sabor e a marca, se é diet ou não)

- **frutas e verduras** (anotar o tipo e o tamanho ou a porção)

- **margarina** (o tipo [% de gordura] e a marca)

- **suco** (natural, em pó, concentrado, com ou sem açúcar, marca)

- **refrigerante** (o sabor, se é light ou normal)

- **bolo** (o sabor, com ou sem recheio, com ou sem cobertura, de festa, etc.)

- **salada de frutas** (colocar o tipo de fruta e outros ingredientes complementares)

LEMBRETE PARA O REGISTRO ALIMENTAR

Anote os alimentos que você ingerir durante todo o dia. Preencha adequadamente as quantidades em medidas caseiras. Lembre-se que quanto mais informação, melhor!

EXEMPLO DE COMO PREENCHER OS REGISTROS

Horário	Alimento	Quantidade
8 h	Pão francês com miolo	½ unidade
	Margarina light Dorian	1 colher de café rasa
	Leite desnatado	½ copo de requeijão
	Café	½ copo de requeijão
	Açúcar cristal	2 colh. de sobremesa
10 h	Banana nanica	1 unidade média
12 h	Arroz branco	5 colh. de sopa cheias
	Feijão carioca, só os grãos	1 concha cheia
	Bife à milanesa (coxão duro)	1 unidade média
	Batata frita	15 palitos
	Alface	3 folhas
	Tomate	½ unidade
	Azeite de oliva	1 fio
	Vinagre de vinho tinto	1 colher de chá
	Suco de laranja natural	1 copo americano
16 h	Bolacha recheada sabor morango Baudduco	4 unidades
21 h	Pão francês sem miolo	2 unidades
	Requeijão tradicional	1 colher de sopa
	Mortadela tradicional	3 fatias
	Queijo mussarela	2 fatias
	Paçoquinha (± 3 x 3 cm)	1 unidade
	Coca-cola normal	1 ½ copo de requeijão

1º REGISTRO - DURANTE A SEMANA
DATA: __/__/__ DIA DA SEMANA: _____

DATA: ____/____/____ DIA DA SEMANA: _____

[illegible]

2º REGISTRO - DURANTE A SEMANA

DATA: ____/____/____ DIA DA SEMANA: _____

DATA: ____/____/____ DIA DA SEMANA: _____

[illegible]

DATA: ____/____/____ DIA DA SEMANA: _____

DATA: ____/____/____ DIA DA SEMANA: _____

[illegible]

ANEXOS

ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Goiânia, 05 de novembro de 2012.

PARECER CONSUBSTANCIADO *Protocolo n. 189/12*

I. Identificação:

1. *Título do Projeto:* **Estudo da Prevalência de Fatores de Risco Cardiovascular em Cadetes da Academia da Força Aérea.**
2. *Pesquisadora Responsável:* Fernanda Elisabete Hilgenberg (Mestranda)
3. *Orientadora:* Profª Cristiane Cominetti
4. *Unidade/Órgão:* Faculdade de Nutrição/FF-UFG
5. *Data de apresentação do protocolo ao CEP:* 26/09/12
6. *Data do Relato:* 15/10/12
7. *Data de Atendimento das Pendências:* 01/11/12

II. Pendências apontadas anteriormente:

- 1) Rever a assinatura do responsável pela instituição onde será realizado o estudo, uma vez que a profª Cristiane Cominetti é orientadora do projeto.
- 2) Esclarecer, na metodologia do projeto, qual será a sequência de realização dos procedimentos que constituem o processo de coleta de dados.
- 3) Revisar todas as questões relativas ao TCLE.
- 4) Esclarecer e adequar cronograma de coleta de dados.
- 5) Fornecer cópia legível do termo de anuência.

Apreciação:

- Foi apresentado protocolo completo na versão digital. Na versão impressa foram apresentadas apenas as pendências atendidas.
- Foi apresentada nova folha de rosto da CONEP, com a assinatura da diretora da Faculdade de Nutrição/UFG.
- Ficou esclarecida na metodologia a sequência dos procedimentos que constituem o processo de coleta de dados. Serão destinados 3 encontros (entrevista individual, avaliação antropométrica e coleta de sangue), de acordo com a disponibilidade de cada sujeito.
- As questões relativas ao TCLE foram revisadas.
- O cronograma de coleta de dados foi adequado (início em dezembro/2012).
- Foi apresentada cópia legível do termo de anuência.

* **Recomendamos:** -adequar a informação sobre a quantidade de sangue a ser coletado (no projeto e TCLE consta **5 a 8ml** e no anexo 1: “orientação para coleta de sangue”, **15ml**); após 5 anos, picotar e reciclar os registros em papel, ao invés de incinerar.

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus
Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.
Email: cep.prppg.ufg@gmail.com

90
12

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

III. Parecer do CEP: Consideramos o *Protocolo 189/12* **Aprovado**, smj desse comitê.

IV. Data da reunião: 05/11/12

João Batista de Souza
Prof. João Batista de Souza
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/UFG

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa/CEP

ANEXO 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), de uma pesquisa. Meu nome é FERNANDA ELISABETE HILGENBERG, sou nutricionista e mestranda em Nutrição e Saúde, minha linha de pesquisa é Diagnóstico e Intervenção Nutricional.

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, caso concorde em fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é minha. Caso você não queira ou simplesmente desista, você não será penalizado (a) de forma alguma.

Se houver dúvida **sobre a pesquisa**, você poderá entrar em contato com o(s) pesquisador (es) responsável (is), FERNANDA ELISABETE HILGENBERG ou CRISTIANE COMINETTI, nos telefones: (19) 8125-9647 ou (62) 3209-6270, ramal 210, lembrando que as ligações podem ser feitas a cobrar. Em casos de dúvidas **sobre os seus direitos** como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3521-1075 ou (62) 3521-1076.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA

A pesquisa é intitulada “PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR EM CADETES DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA”. A realização deste trabalho se deve ao número elevado de fatores ligados as doenças do coração em adultos jovens e na falta de esclarecimento sobre as consequências negativas das doenças do coração para as Forças Armadas Brasileiras, tendo em vista que a carreira militar exige de seu efetivo um estado de saúde adequado para a realização de missões específicas em tempo de paz ou de guerra, que pode levar o militar a extrapolar seus limites físicos. O objetivo da pesquisa é realizar exames para verificar se há risco de aparecimento de doenças do coração em cadetes da Academia da Força Aérea.

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA

Após receber informações sobre a pesquisa em reunião previamente agendada, você passará pelas seguintes avaliações, na seguinte sequência:

1. **Análise do estilo de vida:** em entrevista individual com a nutricionista responsável pela pesquisa, você responderá a questões sobre seu estilo de vida, sua história familiar, a prática de exercícios físicos e a outros fatores de risco para doenças do coração. Se não houver nenhum fator que impeça sua participação na pesquisa, a próxima etapa será a avaliação do consumo alimentar.
2. **Avaliação do consumo alimentar:** ainda no dia da entrevista individual, você receberá instruções sobre o preenchimento de um registro alimentar de 3 dias (2 dias de semana e 1 dia de fim de semana). Este registro é uma espécie de diário aonde você anotada tudo que come durante o dia inteiro. O registro tem como objetivo avaliar o quanto você ingere de açúcares, gorduras, proteínas e calorias diariamente. Você escolherá os dias em que preencherá este caderno, o que facilitará sua rotina.
3. **Avaliação da composição corporal:** em outro dia, que será agendado de acordo com sua disponibilidade, você passará por uma avaliação corporal que inclui medidas de:
 - **Peso:** para a verificação do peso, você será posicionado no centro de uma balança e deverá estar sem calçados e em posição ereta;

- **Altura:** será usado um estadiômetro (aparelho que mede a altura) com haste móvel. Você deverá permanecer com os pés unidos; encostados no aparelho e com a cabeça ereta e olhando para frente;
 - **Percentual de gordura corporal:** será utilizado um adipômetro (aparelho que avalia a o quanto de gordura existe no corpo). Você deverá permanecer com os músculos bem relaxados no momento da aferição das dobras de pele do braço, das costas e do abdômen;
 - **Pressão arterial:** será utilizado um aparelho medidor de pressão ao redor do seu braço, sendo esta avaliação repetida por duas vezes.
4. **Coleta de Sangue:** em um terceiro dia, também agendado conforme sua disponibilidade, você será convidado a comparecer ao laboratório para coletar sangue. Você deverá ficar sem comer durante 12 horas. Serão coletados entre 5 a 8 mL de sangue para analisar a quantidade de gordura e de açúcar no sangue.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA

Os resultados obtidos com a pesquisa serão divulgados por meio dos seguintes recursos:

- Apresentação em forma de palestra para todo corpo de cadetes da AFA, com data prevista para o mês de junho de 2013;
- Publicação dos resultados em artigos científicos de revistas internacionais e nacionais;
- Divulgação da dissertação de mestrado (em formato pdf) no site do Mestrado em Nutrição em Saúde da UFG.

DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS:

Existe pouca chance de você sofrer algum dano à saúde como consequência imediata ou tardia da pesquisa. Os sintomas que podem ocorrer são devido a coleta de sangue, tais como inchaço ou mancha escura na região da picada da agulha, bem como tontura e/ou fraqueza imediatamente após a coleta. Como você estará em jejum no momento da coleta de sangue, você receberá um lanche após esta coleta.

BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS

A identificação dos fatores relacionados às doenças do coração, como o colesterol e os triglicérides acima dos valores normais, o padrão alimentar inadequado, o hábito de fumar e beber, o peso acima do ideal e a inatividade física, podem subsidiar medidas eficazes na prevenção e no tratamento de doenças do coração.

ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIA DO SUJEITO DA PESQUISA

- 1- Todos os participantes terão acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas;
- 2- Todo o material coletado, incluindo sangue e dados de entrevistas e registros alimentares, será utilizado única e exclusivamente na realização desta pesquisa. O sangue excedente será apropriadamente descartado e os registros em papel serão armazenados durante cinco anos, sendo, posteriormente, incinerados;
- 3- Os participantes também terão liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência;

- 4- Todos os resultados obtidos serão confidenciais, sigilosos e privativos. Também é garantido o acesso irrestrito dos voluntários aos resultados do estudo, tendo eles opção de tomar ou não conhecimento dessas informações;
- 5- Dados individuais, resultados de exames e testes somente serão acessíveis aos pesquisadores envolvidos e não será permitido o acesso de terceiros;
- 6- Caso ocorra algum dano à saúde decorrente da pesquisa, os voluntários serão indenizados pela instituição;
- 7- Todos os voluntários estarão protegidos contra qualquer tipo de discriminação e/ou estigmatização, individual ou coletiva, uma vez que todos os resultados serão confidenciais;
- 8- A pesquisa será imediatamente interrompida se for percebido algum risco ou dano à saúde do participante da pesquisa, conseqüente à mesma, não previsto no termo de consentimento.

Nome e Assinatura do pesquisador:

CONSENTIMENTO COMO SUJEITO DA PESQUISA

Eu, _____ RG _____ CPF _____

concordo em participar do estudo acima como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelas pesquisadoras sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação. Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.

Local e data: _____

Assinatura: _____

ANEXO 3

Normas de publicação da Revista Brasileira de Cardiologia

ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1. Os Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol) são uma publicação mensal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, indexada no Cumulated Index Medicus da National Library of Medicine e nos bancos de dados do MEDLINE, EMBASE, LILACS, Scopus e da SciELO com citação no PubMed (United States National Library of Medicine) em inglês e português.

2. Ao submeter o manuscrito, os autores assumem a responsabilidade de o trabalho não ter sido previamente publicado e nem estar sendo analisado por outra revista. Todas as contribuições científicas são revisadas pelo Editor-Chefe, pelo Supervisor Editorial, Editores Associados e pelos Membros do Conselho Editorial. Só são encaminhados aos revisores os artigos que estejam rigorosamente de acordo com as normas especificadas. Os trabalhos também são submetidos à revisão estatística, sempre que necessário. A aceitação será feita na originalidade, significância e contribuição científica para o conhecimento da área.

3. Seções

3.1. Editorial: todos os editoriais dos Arquivos são feitos através de convite. Não serão aceitos editoriais enviados espontaneamente.

3.2. Carta ao Editor: correspondências de conteúdo científico relacionadas a artigos publicados na revista nos dois meses anteriores serão avaliadas para publicação. Os autores do artigo original citado serão convidados a responder.

3.3. Artigo Original: Os Arquivos aceitam todos os tipos de pesquisa original na área cardiovascular, incluindo pesquisas em seres humanos e pesquisa experimental.

3.4. Revisões: os editores formulam convites para a maioria das revisões. No entanto, trabalhos de alto nível, realizados por autores ou grupos com histórico de publicações na área serão bem-vindos. Não serão aceitos, nessa seção, trabalhos cujo autor principal não tenha vasto currículo acadêmico ou de publicações, verificado através do sistema Lattes (CNPQ), Pubmed ou SciELO.

Eventualmente, revisões submetidas espontaneamente poderão ser re-classificadas como "Atualização Clínica" e publicadas nas páginas eletrônicas, na internet (ver adiante).

3.5. Comunicação Breve: experiências originais, cuja relevância para o conhecimento do tema justifique a apresentação de dados iniciais de pequenas séries, ou dados parciais de ensaios clínicos, serão aceitos para avaliação.

3.6. Correlação Anátomo-Clínica: apresentação de um caso clínico e discussão de aspectos de interesse relacionados aos conteúdos clínico, laboratorial e anátomo-patológico.

3.7. Correlação Clínico-Radiográfica: apresentação de um caso de cardiopatia congênita, salientando a importância dos elementos radiográficos e/ou clínicos para a consequente correlação com os outros exames, que comprovam o diagnóstico. Ultima-se daí a conduta adotada.

3.8. Atualização Clínica: Essa seção busca focar temas de interesse clínico, porém com potencial de impacto mais restrito. Trabalhos de alto nível, realizados por autores ou grupos com histórico de publicações na área serão aceitos para revisão.

3.9. Relato de Caso: casos que incluam descrições originais de observações clínicas, ou que representem originalidade de um diagnóstico ou tratamento, ou que ilustrem situações pouco frequentes na prática clínica e que mereçam uma maior compreensão e atenção por parte dos cardiologistas serão aceitos para avaliação.

3.10. Imagem Cardiovascular: imagens clínicas ou de pesquisa básica, ou de exames complementares que ilustrem aspectos interessantes de métodos de imagem, que esclareçam mecanismos de doenças cardiovasculares, que ressaltem pontos relevantes da fisiopatologia, diagnóstico ou tratamento serão consideradas para publicação.

3.11. Ponto de Vista: apresenta uma posição ou opinião dos autores a respeito de um tema científico específico. Esta posição ou opinião deve estar adequadamente fundamentada na literatura ou em sua experiência pessoal, aspectos que irão ser a base do parecer a ser emitido.

4. Processo de submissão: os manuscritos deverão ser enviados via internet, seguindo as instruções disponíveis no endereço:

<http://www.arquivosonline.com.br> do portal da SBC.

5. Todos os manuscritos são avaliados para publicação no menor prazo possível, porém, trabalhos que mereçam avaliação especial para publicação acelerada (“fast-track”) devem ser indicados na carta ao editor.

6. Os textos e as tabelas devem ser editados em word e as figuras e ilustrações devem ser anexados em arquivos separados, na área apropriada do sistema. Figuras devem ter extensão JPEG e resolução mínima de 300 DPI. As Normas para Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos encontram-se em http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/informacoes_autores.asp.

7. Todos os artigos devem vir acompanhados por uma carta de submissão ao editor, indicando a seção em que o artigo deva ser incluído (vide lista acima), declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando ou não conflitos de interesse* e a inexistência de problemas éticos relacionados.

8. Conflito de interesses: Quando existe alguma relação entre os autores e qualquer entidade pública ou privada que pode derivar algum conflito de interesse, essa possibilidade deve ser comunicada e será informada no final do artigo.

9. Formulário de contribuição do autor: Todos os autores e colaboradores devem enviar um formulário

(http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/contribution_form_abc_portugues.pdf) especificando a função exercida no estudo/artigo. Os artigos aceitos não serão publicados até que os formulários assinados por todos os autores sejam recebidos.

10. Ética

10.1. Os autores devem informar, no texto, se a pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética em Pesquisa de sua instituição em consoante à Declaração de Helsinki.

10.2. Nos trabalhos experimentais envolvendo animais, as normas estabelecidas no “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (Institute of Laboratory Animal Resources, National Academy of Sciences, Washington, D. C. 1996) e os Princípios Éticos na Experimentação Animal do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) devem ser respeitados.

11. Citações bibliográficas: Os Arquivos adotam as Normas de Vancouver – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (www.icmje.org).

12. Idioma: os artigos devem ser redigidos em português (com a ortografia vigente) e/ou inglês.

12.1. Para os trabalhos que não possuem versão em inglês ou que essa seja julgada inadequada pelo Conselho Editorial, a revista providenciará a tradução sem ônus para o(s) autor(es).

12.2 Caso já exista a versão em inglês, tal versão deve ser enviada para agilizar a publicação.

12.3. As versões inglês e português serão disponibilizadas na íntegra no endereço eletrônico da SBC (<http://www.arquivosonline.com.br>) e da SciELO (www.scielo.br), permanecendo à disposição da comunidade internacional.

13. Avaliação pelos Pares (*peer review*): Todos os trabalhos enviados aos ABC serão submetidos à avaliação inicial dos editores, que decidirão, ou não, pelo envio para revisão por pares (*peer review*), todos eles pesquisadores com publicação regular em

revistas indexadas e cardiologistas com alta qualificação (Corpo de Revisores dos ABC <http://www.arquivosonline.com.br/conselhoderevisores/>).

13.1. Os autores podem indicar até cinco membros do Conselho de Revisores que gostariam que analisassem o artigo, assim como podem indicar até cinco revisores que não gostariam que participassem do processo.

13.2. Os revisores farão comentários gerais sobre o trabalho e decidirão se ele deve ser publicado, corrigido segundo as recomendações ou rejeitado.

13.3. Os editores, de posse dos comentários dos revisores, tomarão a decisão final. Em caso de discrepâncias entre os revisores, poderá ser solicitada uma nova opinião para melhor julgamento.

13.4. Quando forem sugeridas modificações, essas serão encaminhadas ao autor principal para resposta e, em seguida, aos revisores para que verifiquem se as exigências foram satisfeitas.

13.5. Em casos excepcionais, quando o assunto do manuscrito assim o exigir, o Editor poderá solicitar a colaboração de um profissional que não conste do Corpo de Revisores.

13.6. Os autores têm o prazo de trinta dias para proceder às modificações solicitadas pelos revisores e submeter novamente o artigo. A inobservância desse prazo implicará na retirada do artigo do processo de revisão.

13.7. Sendo aceitos para revisão, os pareceres dos revisores deverão ser produzidos no prazo de 30 dias.

13.8. As decisões serão comunicadas por correio eletrônico.

13.9. Os editores não discutirão as decisões por telefone, nem pessoalmente. Todas as réplicas deverão ser submetidas por escrito para a revista.

13.10. Direitos Autorais: Os autores dos artigos aprovados deverão encaminhar para os Arquivos previamente à publicação, a declaração de transferência de direitos autorais, assinada por todos os coautores (imprimir e preencher a carta no link:

<http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/Transferencia-de-Direitos-Autorais-v1.pdf> .

13.11. Limites de texto: A contagem eletrônica de palavras deve incluir a página inicial, resumo, texto, referências e legenda de figuras.

	Artigo original	Editorial	Artigo Revisão Atualização Clínica	Relato de Caso	Comunicação Breve	Ponto de Vista	Carta ao Editor	Imagem	Correções
Nº máx. de autores	10	2	4	6	8	8	3	2	4
Título (caracteres incluindo espaços)	100	80	100	80	80	80	80	80	80
Título reduzido (caracteres incluindo espaços)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Resumo (nº máx. de palavras)	250	--	250	--	250	--	--	--	--
Nº máx. de palavras (incluindo referências)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Nº máx. de referências	40	10	80	10	10	10	5	--	10
Nº máx. de tabelas + figuras	8	2	8	2	2	2	1	1	1

14. Os artigos deverão seguir a seguinte ordem:

14.1. Página de título;

14.2. Texto

14.3. Agradecimentos

14.4. Legendas de figuras

14.5. Tabelas

14.6. Figuras

14.7. Referências

14.8. Primeira Página:

- Deve conter o título completo do trabalho de maneira concisa e descritiva, em português e inglês, assim como um título resumido (inferior a 50 caracteres, incluindo espaços) para ser utilizado no cabeçalho das demais páginas do artigo;

- Devem ser incluídos de três a cinco descritores (palavras-chave), assim como a respectiva tradução para as key words (descriptors). Os descritores devem ser consultados nos sites: <http://decs.bvs.br/>, que contém termos em português, espanhol e inglês ou www.nlm.nih.gov/mesh, para termos somente em inglês;

14.9. Segunda Página:

- Resumo: O resumo deve ser estruturado em cinco seções, evitando abreviações e observando o número máximo de palavras.

Os Relatos de Casos não devem apresentar resumo. Não cite referências no resumo:

- Fundamento (racional para o estudo);
- Objetivos;
- Métodos (breve descrição da metodologia empregada);
- Resultados (apenas os principais e mais significativos);

- Conclusões (frase(s) sucinta(s) com a interpretação dos dados).

14.10. Texto: Deve ser dividido em introdução, métodos, resultados, discussão e conclusões.

14.10.1. Introdução:

- Não ultrapassar mais que 350 palavras.
- Faça uma descrição dos fundamentos e do racional do estudo, justificando com base na literatura.

14.10.2. Métodos: Descreva detalhadamente como foram selecionados os sujeitos da pesquisa observacional ou experimental (pacientes ou animais de experimentação, incluindo o grupo controle, quando houver), incluindo idade e sexo.

- A definição de raças só deve ser utilizada quando for possível de ser feita com clareza e quando for relevante para o tema explorado.
- Identifique os equipamentos e reagentes utilizados (incluindo nome do fabricante, modelo e país de fabricação) e dê detalhes dos procedimentos e técnicas utilizadas de modo a permitir que outros investigadores possam reproduzir os seus dados.
- Justifique o emprego dos seus métodos e avalie possíveis limitações.
- Descreva todas as drogas e fármacos utilizados, doses e vias de administração.
- Descreva o protocolo utilizado (intervenções, desfechos, métodos de alocação, mascaramento e análise estatística).
- Em caso de estudos em seres humanos indique se o trabalho foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa e se os pacientes assinaram termo de consentimento livre e esclarecido.

- Ao final da sessão de métodos, indicar as fontes de financiamento do estudo.

14.10.3. Resultados: sempre que possível, subdivididos em itens para maior clareza de exposição e apoiados em número não excessivo de gráficos, tabelas, quadros e figuras.

Orienta-se evitar superposição dos dados como texto e tabela. 14.10.4. Discussão: relacionada diretamente ao tema a luz da literatura, salientando os aspectos novos e importantes do estudo, suas implicações e limitações. O último período deve expressar conclusões ou, se pertinentes, recomendações e implicações clínicas.

14.10.5. Conclusões

15. Agradecimentos: devem vir após o texto. Nesta seção é possível agradecer a todas as fontes de apoio ao projeto de pesquisa, assim como contribuições individuais.

15.1. Cada pessoa citada na seção de agradecimentos deve enviar uma carta autorizando a inclusão do seu nome, uma vez que pode implicar em endosso dos dados e conclusões.

15.2. Não é necessário consentimento por escrito de membros da equipe de trabalho, ou colaboradores externos, desde que o papel de cada um esteja descrito nos agradecimentos.

16. Referências: Os Arquivos seguem as Normas de Vancouver.

16.1. As referências devem ser citadas numericamente, por ordem de aparecimento no texto, formatadas sobrescritas.

16.2. Se forem citadas mais de duas referências em sequência, apenas a primeira e a última devem ser digitadas, sendo separadas por um traço (Exemplo: 5-8).

16.3. Em caso de citação alternada, todas as referências devem ser digitadas, separadas por vírgula (Exemplo: 12, 19, 23). As abreviações devem ser definidas na primeira aparição no texto.

16.5. As referências não podem ter o parágrafo justificado e sim alinhado à esquerda.

16.6. Comunicações pessoais e dados não publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas apenas mencionados no texto e em nota de rodapé na página em que é mencionado.

16.7. Citar os autores da obra se forem seis ou menos ou apenas os seis primeiros seguidos de et al, se forem mais de seis.

16.8. As abreviações das revistas devem estar em conformidade com o Index Medicus/Medline – na publicação List of Journals Indexed in Index Medicus ou através do site <http://www.nlm.nih.gov/pubs/libprog.html> at <http://locatorplus.gov>.

16.9. Só serão aceitas citações de revistas indexadas, ou, em caso de livros, que possuam registro ISBN (International Standard Book Number).

16.10. Resumos apresentados em congressos (abstracts) só serão aceitos até dois anos após a apresentação e devem conter na referência o termo “resumo de congresso” ou “abstract”.

17. Política de valorização: Os editores estimulam a citação de artigos publicados nos Arquivos.

18. Tabelas: devem ser apresentadas quando necessárias para a efetiva compreensão do trabalho, não contendo informações redundantes já citadas no texto e numeradas por ordem de aparecimento. Indicar os marcadores de rodapé na seguinte ordem: *, †, ‡, §, //, ¶, #, **, ††, etc. O Manual de Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio de Artigos à Revista ABC está no endereço: http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/manual_de_formatacao_abc.pdf.

19. Figuras: para a submissão, as figuras devem ter boa resolução para serem avaliadas pelos revisores. As legendas das figuras devem ser formatadas em espaço duplo, estar em páginas numeradas e separadas, ordenadas após as Referências. As abreviações usadas nas ilustrações devem ser explicitadas nas legendas. O Manual de Formatação de Tabelas, Figuras e Gráficos para Envio de Artigos à Revista ABC está no endereço: <http://www.arquivosonline.com.br/publicacao/normas/pdf/Manualde-Formatacao-ABC.pdf>.

20. Imagens (online): Para os artigos aprovados que contenham exames (exemplo: ecocardiograma e filmes de cinecoronariografia) devem ser enviados como imagens em movimento no formato AVI ou MPEG para serem disponibilizados no site <http://www.arquivosonline.com.br>.