




Figura 6: Aspecto visual da cultura de células de melanoma SK-MEL-37 após 24 horas de tratamento com uma concentração de 100 µM dos diversos DT estudados: (16) *p*-metilacetofenona tio-canfero, (17) *p*-fluoracetofenona tio-canfero, (18) *p*-hidroxiacetofenona tio-canfero, (19) furano tio-canfero, (20) 3-metóxi-4-hidroxi-benzaldeído tio-canfero, (21) *p*-fluorbenzaldeído tio-canfero, (22) 2-hidroxi-benzaldeído tio-canfero, (23) aldeído cinâmico tio-canfero, (24) tiofeno-2-carboxialdeído tio-canfero, (25) 1-H-pirrol-2-carboxialdeído tio-canfero, (26) 1-H-imidazol-4-carboxialdeído tio-canfero, (27) tiossemicarozida tio-canfero, (28) canfero, (29) controle etanol/DMSO (10%/90%) e (30) controle. As células foram observadas e fotografadas com microscópio óptico invertido no próprio frasco de cultivo. Ampliação 200x.




Figura 7: - Aspecto visual da cultura de células de melanoma SK-MEL-37 após 48 horas de tratamento com uma concentração de 100 μ M dos diversos DT estudados: (1) Controle, (2) benzaldeído tio-limoneno, (3) Tiossemicarbazida limoneno, (4) o-nitro tio-limoneno, (5) m-nitro tio-limoneno, (6) *p*-nitro tio-limoneno, (7) *p*-dimetilamino tio-limoneno, (8) *p*-hidróxi tio-limoneno, (9) benzofenona tio-canfeno, (10) mentona tio-canfeno, (11) etil piruvato tio-canfeno, (12) acetofenona tio-canfeno, (13) *p*-nitroacetofenona tio-canfeno, (14) *p*-cloroacetofenona tio-canfeno e (15) *p*-metoxiacetofenona tio-canfeno. As células foram observadas e fotografadas com microscópio óptico invertido no próprio frasco de cultivo. Ampliação 100x.




Figura 7- Aspecto visual da cultura de células de melanoma SK-MEL-37 após 48 horas de tratamento com uma concentração de 100 μM dos diversos DT estudados: (16) *p*-metilacetofenona tio-canfero, (17) *p*-fluoracetofenona tio-canfero, (18) *p*-hidroxiacetofenona tio-canfero, (19) furano tio-canfero, (20) 3-metóxi-4-hidroxibenzaldeído tio-canfero, (21) *p*-fluorbenzaldeído tio-canfero, (22) 2-hidroxibenzaldeído tio-canfero, (23) aldeído cinâmico tio-canfero, (24) tiofeno-2-carboxialdeído tio-canfero, (25) 1-H-pirrol-2-carboxialdeído tio-canfero, (26) 1-H-imidazol-4-carboxialdeído tio-canfero, (27) tiossemicarozida tio-canfero, (28) canfero, (29) controle etanol/DMSO (10%/90%) e (30) controle. As células foram observadas e fotografadas com microscópio óptico invertido no próprio frasco de cultivo. Ampliação 100x.