

Tabela 2. Perfil de suscetibilidade a 12 antimicrobianos de cocos Gram-positivos isolados em hemoculturas de pacientes internados na UTI clínica de um hospital escola em Goiânia-Goiás, abril de 2003 a abril de 2004.

Bactéria	AMP	AMP/S	AMX/C	CFZ	CRO	OXA	LIN	VAN	SYN	TRP/S	GAT	CLI
<i>S. aureus</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S	R
<i>S. aureus</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	R	S	R
<i>S. aureus</i>	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>S. aureus</i>	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R	R	R
<i>S. aureus</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	R	R	R
<i>S. aureus</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S	R
<i>S. epidermidis</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	R	R	I
<i>S. epidermidis</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	R	S	R
<i>S. epidermidis</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	R	S	S	R
<i>S. hominis</i>	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>S. simulans</i>	R	R	R	R	R	R	S	S	S	S	S	S
<i>S. warneri</i>	R	I	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>E. faecalis</i>	S	S	S	I	I	I	S	S	R	S	S	I
<i>E. faecalis</i>	S	S	S	S	I	I	S	S	R	S	S	I
<i>E. faecalis</i>	S	S	S	S	I	I	S	S	R	S	S	I
<i>Micrococcus sp</i>	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S

S: sensível, I: resistência intermediária, R: resistente, AMP: ampicilina, AMP/S: ampicilina/sulbactam, AMX/C: amoxicilina/ácido clavulânico, CFZ: cefazolina, CRO: ceftriaxona, OXA: oxacilina, LIN: linezolida, VAN: vancomicina, SYN: synercid, TRP/S: trimetoprim-sulfametoxazol, GAT: gatifloxacina, CLI: clindamicina.

Tabela 3. Perfil de suscetibilidade a 12 antimicrobianos de bastonetes Gram-positivos isolados em hemoculturas de pacientes internados na UTI clínica de um hospital escola em Goiânia-Goiás, abril de 2003 a abril de 2004.

Bactéria	AMP	AMP/S	PIP	PIP/T	AZM	IPN	MER	CAZ	CIP	LEV	GEN	TRI/S
<i>K. pneumoniae</i>	R	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>K. pneumoniae</i>	R	S	I	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>K. pneumoniae</i>	R	R	R	R	R	S	S	R	R	R	R	R
<i>K. pneumoniae</i>	R	I	I	S	S	S	S	S	R	R	S	R
<i>K. pneumoniae</i>	R	I	I	S	S	S	S	R	R	R	S	R
<i>K. pneumoniae</i>	R	R	R	S	R	S	S	R	S	S	R	R
<i>P. mirabilis</i>	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R
<i>P. mirabilis</i>	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R
<i>P. mirabilis</i>	R	S	R	S	S	S	S	S	S	S	S	R
<i>E. cloacae</i>	R	R	R	R	R	S	S	R	S	S	I	S

S: sensível, I: resistência intermediária, R: resistente, AMP: ampicilina, AMP/S: ampicilina/sulbactam, PIP: piperacilina, PIP/T: piperacilina/tazobactam, AZM: aztreonam, IPN: imipenem, MER: meropenem, CAZ: ceftazidima, CIP: ciprofloxacina, LEV: levofloxacina, GEN: gentamicina, TRI/S: trimetoprim/sulfametoxazol.

Tabela 4. Perfil de suscetibilidade a 12 antimicrobianos de bastonetes Gram-negativos não fermentadores isolados em hemoculturas de pacientes internados na UTI clínica de um hospital escola em Goiânia-Goiás, abril de 2003 a abril de 2004.

Bactéria	AMP	AMP/S	PIP	PIP/T	AZM	IMP	MER	CPM	CIP	LEV	GEN	AMC
<i>P. stutzeri</i>	I	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
<i>P. stutzeri</i>	R	R	R	R	R	S	S	R	R	R	R	S
<i>P. stutzeri</i>	R	R	R	R	I	S	S	R	R	R	R	R
<i>P. stutzeri</i>	I	S	I	S	R	S	S	I	S	S	S	S
<i>P. stutzeri</i>	I	S	I	S	R	S	S	I	S	S	S	S
<i>P. stutzeri</i>	R	S	R	R	R	S	S	R	R	R	R	R
<i>P. stutzeri</i>	R	S	R	R	R	S	S	R	R	R	R	R
<i>P. stutzeri</i>	R	S	R	I	R	S	S	I	R	R	S	R
<i>P. aeruginosa</i>	R	R	R	R	R	S	I	R	R	R	R	R
<i>A.baumannii</i>	R	R	R	NR	S	S	S	R	R	R	R	R
<i>A.baumannii</i>	R	R	R	NR	I	S	S	R	R	R	R	R
<i>B. cepacia</i>	S	S	S	S	S	R	S	S	S	S	S	S

S: sensível, I: resistência intermediária, R: resistente, NR: não realizado, AMP: ampicilina, AMP/S: ampicilina/sulbactam, PIP: piperacilina, PIP/T: piperacilina/tazobactam, AZM: aztreonam, IMP: imipenem, MER: meropenem, CEP: cefepima, CIP: ciprofloxacina, LEV: levofloxacina, GEN: gentamicina, AMC: amicacina.